



平成 29 年度

事業年報

第 34 集



八戸市総合健診センター
八戸市医師会

はじめに

平素より、当センターが実施しております事業の運営におきまして、格別なご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

当センターは昭和53年に開設され、平成24年4月には公益財団法人に移行しました。これまで地域住民の生活習慣病予防を中心とした健康診断、健康指導及び健康教育事業を行い、一貫して地域住民の健康の保持・増進に努めてまいりました。

一方がん対策基本法施行以来の懸案であるがん検診受診率、精検受診率の向上に関しましても、市民公開講座での啓発活動や行政と連携した健診の電話勧奨など積極的に取り組んでおります。今後は中・高生を対象として、early exposure を主眼としたがん教育や生活習慣病予防講座などの開催も考量する所存です。

さらに、令和2年度の新健診システム稼働により、これまで以上に円滑な健診フローで受診者の負担軽減を目指し、堅実な精度管理のもと安全で質の高い健診およびがん検診を提供できるよう努力してまいります。今後とも皆さまのより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

さてこのたび、平成29年度の実績をまとめました事業年報第34集ができあがり、刊行の運びとなりました。ご高覧いただき、当センターに対するご理解の一助になれば幸いに存じます。

結びに、年報編集にあたりご尽力いただきました八戸市医師会の先生方をはじめ、センターの年報編集委員会の関係者の皆様方に心から感謝申し上げます。

令和2年1月

公益財団法人八戸市総合健診センター

所長 岡 本 道 孝

目 次

はじめに

目次

八戸市総合健診センター概要

1 設立目的	1
2 基本理念・基本方針	2
3 お客様の権利と責務・個人情報に関する基本方針	3
4 施設認定取得状況	4
5 沿革	5
6 組織機構	7
7 職種別職員数	8
8 平成29年度実施事業	9
9 健康教育	12
10 学会発表等	13

健診報告

平成29年度 有所見・要精検の条件	19
-------------------------	----

I 一般健康診断	21
----------------	----

II 地域住民の健康診断

II-1 八戸市	35
----------------	----

II-2 階上町	49
----------------	----

III 人間ドック	61
-----------------	----

IV 項目別精検結果

IV-1 糖尿病検診	75
------------------	----

IV-2 眼科検診	76
-----------------	----

IV-3 循環器系・腎機能・肝機能検診	78
---------------------------	----

IV-4 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診	79
------------------------------------	----

IV-5 聴力検診	82
-----------------	----

IV-6 骨検診	83
----------------	----

IV-7 肝炎ウイルス検診	84
---------------------	----

V がん検診など

V-1 胃がん検診	85
-----------------	----

V-2 大腸がん検診	87
------------------	----

V-3 胸部検診	89
----------------	----

V-4 子宮頸がん検診	92
-------------------	----

V-5 婦人科超音波検査（施設内）	94
-------------------------	----

V-6 乳がん検診	96
-----------------	----

V-7 前立腺がん検診	102
-------------------	-----

V-8 腹部超音波検診	104
-------------------	-----

VI その他

VI-1 緊急値	107
----------------	-----

VI-2 労災二次健診	108
-------------------	-----

VI-3 特定健康診断・特定保健指導	109
--------------------------	-----

VI-4 特殊検診実績	111
-------------------	-----

VII 八戸市母子保健事業および学校保健事業

（八戸市総合健診センター関係）

VII-1 先天性股関節脱臼検診	113
------------------------	-----

VII-2 児童・生徒心臓検診	114
-----------------------	-----

VII-3 幼児検診	115
------------------	-----

VIII 精度管理実施状況	117
---------------------	-----

八戸市総合健診センター概要

1. 設立目的

八戸市は、昭和39年3月に新産業都市に指定され、北東北随一の工業都市として発展してきました。一方で、全国的に急速に進む工業化の側面として「公害」が社会問題となり、八戸市においても八戸市小中野地区の一部で、せきやタンが出るといった息苦しい症状の集団喘息障害が発症しました。八戸市は、大気汚染等から市民の健康を守らなければならないということから、八戸市医師会と協議を行い、公害、生活習慣病、学校保健、救急災害に取り組んできました。

こうした中、市民の健康を守るためにはチェック機能が必要であるとの観点から、各種健康診断のできる専門的健診センター建設構想がすすみました。そして、地域住民の健康の保持・増進の手助けとして、生活習慣病予防を主眼に予防健診充実による疾病の早期発見、健康教育による自己意識の啓発高揚を図ることを目的に、昭和51年に八戸市、八戸市医師会及び八戸商工会議所の三者で構成する財団法人を設立しました。

この施設を地域保健活動の拠点とし、自動化健診システムを導入して広く地域住民や企業の各種健康診断を実施しています。

設立当初の健診センター（昭和53年）



2. 設立目的・基本方針

設立目的

公益財団法人八戸市総合健診センターは、健康診断サービスを通じて、地域住民の健康保持増進に努め、健康で幸せな社会生活に貢献するため、利用者が満足出来る最高のサービス提供を目指します。

基本方針

公益財団法人八戸市総合健診センターは、健康診断サービスを通じて、地域住民の健康保持増進に努め、健康で幸せな社会生活に貢献することを目的とする。

1. 地域住民の皆様に心から信頼され、満足されるサービスを提供いたします。
2. 職員一人ひとりの専門性を高め、技術の研鑽に取り組みます。
3. 快適な健診が受けられる環境を目指します。
4. 利用者の知る権利を確保するための情報を提供します。
5. 個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な管理をします。

現在の健診センター



3. お客様の権利と責務・個人情報に関する基本方針

お客様の権利と責務

1. お客様は、快適な環境のもと、良質な健診を平等に受ける権利があります。
2. お客様は、健診について十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
3. お客様は、ご自身の健診に関する情報に対して、知る権利があります。
4. お客様は、健診に関する個人情報やプライバシーについて保護される権利があります。
5. お客様は、適切な健診受診のため、ご自身の健康状態に関する正しい情報を提供する責務があります。

個人情報に関する基本方針

公益財団法人八戸市総合健診センターは、個人情報を正確かつ安全に取り扱い保護することを社会的責任と捉え、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、宣言いたします。

個人情報の収集・利用・提供

個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報を保護・管理する体制の確率と、適切な収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守いたします。

個人情報の安全対策

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などが発生しないように万全の予防措置を講ずることで、個人情報の安全性・正確性の確保を図り、 万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施いたします。


個人情報に関する法令の遵守

個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。

継続的改善

個人情報の保護体制を適切に維持するため、内部を継続的に見直し、改善に努めます。

4. 施設認定取得状況



- 労働衛生サービス機能評価認定施設
- 日本人間ドック学会機能評価認定施設
- 日本総合健診医学会優良総合健診認定施設
- 日本臨床細胞学会認定施設
- 日本病院会一日ドック指定施設
- 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診実施機関
- 労災保険二次健診等給付指定医療機関



5. 沿 革

年	月 日	主 た る 行 事
昭和54年	4月1日 6月26日	結核、循環器、胃、子宮がん検診開始 日本自転車振興会より胃部検診車整備費補助金18,000千円決定
55年	2月26日 4月28日	胃部検診車「ひまわり号」搬入 日本病院会より自動化健診施設認定
56年	4月1日	健康診断機関等名簿登載（2-018）
57年	7月8日	乳がん検診開始
58年	8月22日	胸部検診車「ひまわり号」搬入
59年	3月1日 5月21日 6月2日	5周年記念誌「五年のあゆみ」刊行 日本消化器集団検診学会の胃集団検診認定医 日本自転車振興会より医療機器整備費補助金11,000千円決定
60年	4月17日	乳房X線装置導入
61年	6月24日 7月8日 10月1日	超音波診断装置導入 学童心音心電図自動解析装置導入 大腸がん検診、超音波検診開始
63年	10月2日	10周年記念誌「恵風—10年のあゆみ」刊行
平成元年	4月1日	肺がん検診開始
4年	9月16日 12月16日	超音波診断装置（卵巣腫瘍検診用）導入 全国労働衛生団体連合会賛助会員
5年	4月1日 5月31日 10月2日 10月25日	中央労働災害防止協会賛助会員 日本自転車振興会より胃部検診車整備費補助金20,085千円決定 15周年記念事業（講演－東北大学医学部公衆衛生学教室 教授 久道 茂氏、懇親会） 胃部検診車「ひまわり号」更新
6年	5月23日 8月22日 9月12日 10月20日	日本自転車振興会より胸部検診車整備費補助金10,300千円決定 日本乳がん検診学会賛助会員 日本超音波学会賛助会員 胸部検診車「ひまわり号」更新
7年	4月1日 6月2日	全国労働衛生機関厚生年金基金加入 日本自転車振興会より医療機器整備費補助金14,420千円決定
8年	4月1日 5月7日 10月1日 12月19日	八戸市の婦人の健康づくり（骨密度検診）事業開始 卵巣腫瘍検診（事業化）開始 日本総合健診医学会優良総合健診施設認定「認定第064号」 日本自転車振興会より医療機器整備費補助金14,420千円決定 胃部直接・間接X線装置導入 政管健康保険成人病予防検診「日帰りドック」開始 増築棟起工式
9年	10月1日 10月31日 11月4日	前立腺がん検診開始 増築棟完成（床面積1,842.81㎡） 増築棟開館式
10年	5月27日 5月30日	日本自転車振興会より医療機器整備費補助金8,557千円決定 創立20周年記念・増築棟竣工式典（講演－弘前大学 学長 吉田豊氏、祝賀会、記念誌）


年	月 日	主 た る 行 事
12年	5月31日 11月1日	日本自転車振興会より医療機器整備費補助金30,000千円決定 ヘリカルCT肺がん検診開始
13年	6月1日 7月1日	労働衛生機関評価機構認定「認定第86号」 労災保険二次健診等給付医療機関指定「指定第0231088号」
14年	5月28日 11月29日	日本自転車振興会より医療機器整備補助金8,505千円決定 デジタル胃部X線装置導入 ISO14001認証取得「登録証JQA - EM2803」
15年	2月1日 4月1日	マンモグラフィ検診施設画像認定「施設認定証第116号・第117号」 階上町住民健診開始 循環器検診開始
16年	6月1日 10月29日 12月27日	労働衛生機関評価認定更新（第1回目） デジタル胃部X線装置導入 ISO9001認証取得「登録証JQA - QM11837」
17年	4月1日 11月29日 12月17日 12月25日	南郷村の八戸市合併に伴う住民健診開始 ISO14001認定更新（第1回目） 人間ドック・健診施設機能評価認定「認定第81号」 デジタル胃部X線装置導入
18年	2月28日 4月1日 7月1日	デジタル乳房X線装置導入 介護予防（65歳以上）のため生活機能評価事業開始 新健診システム稼働
19年	12月17日	ISO9001認定更新（第1回目）
20年	2月29日 4月1日 10月1日 10月18日 11月29日	デジタル胃部X線装置導入 特定健康診査・特定保健指導事業開始 乳腺エコー検査開始 デジタル胸部X線撮影装置導入 創立30周年記念事業 ISO14001認定更新（第2回目）
21年	4月1日	女性特有のがん検診推進事業（無料クーポン券）開始
22年	11月15日	ヘリカルCT装置導入 デジタル乳房X線装置導入
23年	4月1日 5月21日	がん検診無料クーポン券（大腸がん）事業開始 まちかど健康チェック開始
24年	4月1日	公益財団法人へ移行 健診システム更新
25年	1月22日 10月4日	胃胸部併用X線検診車整備 第1回市民健康セミナー開催
26年	7月1日 9月30日	ISO14001自己宣言への移行 デジタル胃部X線装置導入
27年	5月21日 12月1日	（仮称）八戸市総合保健センターの整備に関する覚書調印 ストレスチェック制度開始
28年	4月1日	八戸市後期高齢者人間ドック開始

6. 組織機構

1. 役員等 32名

- | | | | | |
|-------------|-----|-----------|---------------|----------|
| (1) 理事 | 8名 | 理事長(八戸市長) | 副理事長(八戸市医師会長) | 常務理事(所長) |
| (2) 監事 | 2名 | | | |
| (3) 評議員 | 17名 | | | |
| (4) 評議員選定委員 | 5名 | | | |

2. 事務局 93名 (常勤医師 2名含む)



7. 職種別職員数（重複資格延べ人数）

（令和元年12月 1 日現在）

職種	人数	備考
医師	10	左記のうち 日本医師会認定産業医 5 人間ドック認定医 3 人間ドック専門医 1 人間ドック健診指導医 1 人間ドックアドバイザー 1 労働衛生コンサルタント 1 消化器病専門医 2 日本消化器がん検診終身認定医 1
保健師	7	左記のうち
看護師	26	人間ドック健診情報管理指導士 1
管理栄養士・栄養士	7	人間ドック健診食生活改善指導士 4
		健康運動指導士 4
		ヘルスケア・リーダー 1
		産業保健指導者 1
		産業栄養指導者 1
		心理相談員 1
		中高老年期運動指導士 1
		第1種衛生管理者 6
診療放射線技師	13	左記のうち 胃がん検診専門技師 6 マンモグラフィ撮影技術認定技師 3 肺がんCT検診認定技師 3
臨床検査技師	22	左記のうち 細胞検査士 5 国際細胞検査士 3 超音波検査士（体表臓器領域） 4 〃（健診領域） 3 〃（消化器領域） 3 〃（循環器領域） 2 総合健診指導士 2 有機溶剤作業主任者 1 危険物取扱者 1
事務職員	52	左記のうち 第1種衛生管理者 26 特別管理産業廃棄物管理責任者 3 危険物取扱者 2 2級ボイラー技士・ボイラー取扱い 3
計	137	105

8. 平成29年度 実施事業

(1) 八戸市環境・健康フェスタ2017 ～健康まつり&環境展～

日 時 平成29年10月1日(日)
10時00分～14時00分
会 場 八戸市公民館 2階会議室
内 容 調べてみよう！あなたのロコモ度
「幸せは健康から」コーナー
ロコモ度チェック
肺がん・乳がん模型展示
健診センターPRコーナー
対象者 一般市民
来場者 275名



(2) 第5回市民健康セミナー

日 時 平成29年10月26日(木)
18時00分～20時00分
会 場 八戸プラザホテル プラザホール
演 題 「ぴんぴんキラリの極意」
講 師 青森県立中央病院
医療管理監 小野 正人 氏
健康運動指導士 西村 司 氏
対象者 一般市民
来場者 70名



(3) 健康管理セミナー

日 時 平成30年3月26日(月)
14時30分～16時30分
会 場 Axis グランドサンピア八戸
演 題 『きっと役立つ健康診断』
「特定保健指導のおすすめと
実施後の効果について」
「当センターにおける
ロコモ予防の取り組みについて」
「充実した健康診断の勧め」
対象者 健診受診企業の健康管理担当者
来場者 91名



(4) 健康情報誌「あおば」発行

- ①平成29年7月「あおば」15号 30,000部発行
- ②平成29年12月「あおば」16号 30,000部発行
- ③平成30年3月「あおば」17号 30,000部発行



(5) まちかど健康チェック

実施場所 八戸ポータルミュージアムはっち
対 象 者 一般市民

- ① 平成29年4月1日(土)
 - テ ー マ 「血管年齢、視力、ロコモチェック」
 - 会 場 1階 はっち広場
 - 実施時間 12時00分～14時30分
 - 参加人数 83名
- ② 平成29年10月15日(日)
 - テ ー マ 「血管年齢、乳がん・肺がん啓発」
 - 会 場 2階 シアター2
 - 実施時間 10時00分～11時45分
 - 参加人数 48名
- ③ 平成30年2月3日(土)
 - テ ー マ 「血管年齢・視力・棒反応測定」
 - 会 場 1階 はっち広場
 - 実施時間 12時00分～14時30分
 - 参加人数 88名



(6) 第10回いのちのリレー・市民公開講座

日 時：平成29年10月15日(日)

13時00分～

会 場：八戸ポータルミュージアム

はっち 2F シアター2

内 容：第一部 がん検診への取り組み

①検診と健診による早期発見

②リレー・フォー・ライフについて

③かけがえのない貴方のために

－乳がんはこわくない－

第二部 移植医療の経験と課題、そして“思い”



(7) リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017八戸

日 時：平成29年 6 月24日(土)～25日(日)

12時00分～翌日12時00分

会 場：長者まつりんぐ広場

内 容：がん患者や経験者、家族らがリレー方式で24時間歩き、患者を支援するチャリティイベント。

当センター職員、延べ80名が参加しました。



(8) ジャパン・マンモグラフィー・サンデー、日曜日の婦人がん検診の実施

平成29年10月15日(日) ジャパン・マンモグラフィー・サンデー

平成30年 1 月28日(日) 日曜日の婦人がん検診

平成30年 2 月25日(日) 日曜日の婦人がん検診

子育てや介護、仕事などで多忙な平日を過ごす女性のために、日曜日の乳がん検診、婦人がん検診を実施しています。

9. 健康教育

事業所・団体向けに健康教育のための講師派遣を行っている。事業所・団体のご要望を伺い、健診結果の見方や生活習慣病予防など、テーマに合わせ、保健師、管理栄養士、健康運動指導士等の講師派遣を行っている。

平成29年度は8事業所から依頼があり講師派遣を行った。

実施日	依頼団体	内容	参加人数	職種
6月11日	南浜地区健康づくり推進協議会	健診結果の活用と健康づくりのポイント	50名	保健師
7月26日	大平洋金属(株)	栄養に関する教育、今年度当社健康診断の結果について	30名	管理栄養士
9月11日	(株)高橋製作所	食生活と検査値の関係について	75名	管理栄養士
9月15日	多摩川精機(株)	VDT作業によりあらわれる健康障害とその予防策 VDT作業前後、休憩時に行えるストレッチについて	80名	保健師 健康運動指導士
10月2日	東北地方整備局高瀬川河川事務所	体力測定	3名	ヘルスケアリーダー
11月27日	(株)吉田産業	体力アップで転倒・ロコモ予防	25名	健康運動指導士
12月2日	南郷西地区自治会連合会	健診の達人が伝授する生活改善法	93名	保健師
1月23日	(株)住吉工業	体力アップで転倒・ロコモ予防	40名	健康運動指導士

健康相談

保健師や管理栄養士による健康や栄養に関する個別の健康相談を実施している。健康診断結果や検査についての相談や医療機関の情報提供、栄養相談など電話および来所にて個別の相談を実施した。

保健相談内容	施設内(件)	電話(件)	栄養相談内容	施設内(件)	電話(件)
健診結果について	22	108	食生活について	27	13
検査について	17	174	糖尿病について	0	0
医療機関について	18	122	肥満について	0	0
日常生活について	0	7	その他	4	3
心理相談	1	0			
その他	16	128			
合計	74	539	合計	31	16

事後指導

①1日人間ドック

医師による結果説明後、保健師による個別の保健指導を実施している。平成29年度は211件実施した。

②CT内臓脂肪検査

CT内臓脂肪検査後、希望者には管理栄養士による栄養・運動指導を実施している。平成29年度は98件実施した。

③結果説明(訪問)

事業所や団体からの依頼により、保健師を派遣し、健診結果の説明や健康相談を実施している。平成29年度は1団体15名実施した。

【症例1】門脈の拡張 64代 女性




1年時 門脈 拡張なし

2年時 門脈 拡張あり

※ 門脈の拡張は2年間の経過で認められた。

【症例1】門脈の拡張 65歳 女性




1年時

2年時 門脈 拡張あり

3年時 門脈 拡張あり

※ 門脈の拡張は2年間の経過で認められた。

【症例4】肝動脈狭窄症




1年時 肝動脈 拡張あり

2年時 肝動脈 拡張あり

3年時 肝動脈 拡張あり

※ 肝動脈は2年間の経過で拡張が認められ、3年時から拡張が顕著に

【症例4】肝動脈狭窄症



1年時

2年時 肝動脈 拡張あり

3年時 肝動脈 拡張あり

※ 肝動脈は3年間の経過で拡張が認められ、2年時から拡張が顕著に

【症例1】64代 女性

1年時 門脈拡張が認められ

2年時 肝動脈狭窄が認められ

3年時 肝動脈狭窄が認められ

4年時 肝動脈狭窄が認められ

5年時 門脈拡張が認められ、肝動脈狭窄が認められ

6年時 肝動脈狭窄が認められ

7年時 肝動脈狭窄が認められ

8年時 肝動脈狭窄が認められ

9年時 肝動脈狭窄が認められ

【オースター氏】

肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。

肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。


肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。

【症例1】まとめ

肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。肝動脈狭窄は肝動脈狭窄症の診断に有用な検査である。

「八戸市総合健診センターにおける骨粗鬆症検診の現状」

健診検査課 坂本 恵利子



平成28年度 年代別 受検率と補償受検率

年代	10代	20代	30代	40代	50代
受検率	1	1	71	86	90
補償受検率	1	1	4	27	27
受検率	100%	100%	71.0%	86.0%	90.0%
補償受検率	100%	100%	4.0%	27.0%	27.0%



受検率と補償受検率年代推移

	2016	2017	2018	2019	2020
受検率	100%	100%	100%	100%	100%
補償受検率	100%	100%	100%	100%	100%
受検率	100%	100%	100%	100%	100%
補償受検率	100%	100%	100%	100%	100%

平成28年度 精密検査結果の内訳



H28年度 精密検査対象者の 医療機関受診状況



注目の点

2018年度は、2017年度と比較して、受診率の向上が顕著です。

2018年度は、2017年度と比較して、受診率の向上が顕著です。これは、受診率の向上が顕著です。これは、受診率の向上が顕著です。

2018年度は、2017年度と比較して、受診率の向上が顕著です。これは、受診率の向上が顕著です。これは、受診率の向上が顕著です。

テーマ「きっと役立つ健康診断」

【内容】

第一部「特定保健指導のすすめと実施後の効果について」

健診指導課 田中しづか

- ・ 特定健診・特定保健指導とは
- ・ 特定保健指導のすすめ
- ・ 特定保健指導の効果
- ・ なぜ特定保健指導を受けない？
- ・ 第3期特定健診・特定保健指導の見直しについて
- ・ 詳細な健診項目の変更点
- ・ 標準的な質問票の変更点
- ・ 未治療者への受診勧奨のお願い

第二部「当センターにおけるロコモ予防の取り組みについて」

健診指導課 福島 郁子

- ・ ロコモティブシンドロームとは
- ・ ロコモティブシンドロームの原因
- ・ ロコモティブシンドロームの症状
- ・ 当センターのロコモ予防の取り組み
- ・ 健診結果を用いたメタボとロコモの研究
- ・ ロコモ予防・筋トレ体験
- ・ 30秒立ち上がりテスト

第三部「充実した健康診断の勧め」 業務課 磯谷 拓

- ・ 定期健康診断について
- ・ がん検診等有効なオプションについて



健診報告

平成29年度 有所見の条件

血圧（E 判定を除く）

収縮期	130以上	または
拡張期	85以上	

脂質（E 判定を除く）

T C	139以下または200以上	または
H D L C	39以下または120以上	または
L D L C	120以上	または
T G	150以上	

糖代謝（E 判定を除く、住民健診は尿糖を除く）

空腹時血糖	100以上	または
随時血糖	140以上	または
HbA1c（NGSP）	5.6以上	または
尿糖	1 + 以上	

B M I

25.0以上

腹囲

男性	85.0以上
女性	90.0以上

貧血

男性		
R B C	399以下	または
H b	13.0以下	または
H t	38.4以下	
女性		
R B C	359以下	または
H b	12.0以下	または
H t	35.4以下	

肝機能

A S T	31以上	または
A L T	31以上	または
γ G T	51以上	

聴力1000H z（30dB）

左右いずれかが聞こえなかった

聴力4000H z（40dB）

左右いずれかが聞こえなかった

胸部X線

経過観察C	または
要精検D 1	または
要精検D 2	または
要精検D 3	または
要精検D 4	または
要精検E 1	または
要精検E 2	

喀痰細胞診

要精検C	または
要精検D	または
要精検E	

心電図

軽度異常	または
要経過観察	または
要治療	または
要精検	または
要治療継続	

眼底

軽度異常	または
要経過観察	または
要精検	または
要治療継続	

眼圧

左右いずれかが20以上

尿糖

1 + ～ 6 +

尿蛋白

± ～ 6 +

尿潜血

1 + ～ 6 +

肺機能

%肺活量	79.9以下	または
1 秒率	69.9以下	

腎機能

男性		
B U N	7.9以下または20.1以上	または
C r	1.01以上	または
e G F R	59.9以下	
女性		
B U N	7.9以下または20.1以上	または
C r	0.71以上	または
e G F R	59.9以下	

炎症反応

C R P	0.31以上
-------	--------

平成29年度 要精検の条件

血圧

収縮期	160以上	または
拡張期	100以上	

喀痰細胞診

要精検 C	または
要精検 D	または
要精検 E	

脂質

T C	139以下または260以上	または
H D L C	29以下または120以上	または
L D L C	180以上	または
T G	400以上	

心電図

要治療	または
要精検	

糖代謝（住民健診は尿糖を除く）

空腹時血糖	126以上	または
随時血糖	140以上	または
HbA1c（NGSP）	6.5以上	または
尿糖	1 + 以上	

眼底

要精検

眼圧

左右いずれかが[※]20以上

B M I

尿糖

1 + ～ 6 +

腹囲

尿蛋白

1 + ～ 6 +

貧血

男性		
R B C	359以下	または
H b	11.9以下	または
H t	35.3以下	

尿潜血

2 + ～ 6 +

女性		
R B C	329以下	または
H b	10.9以下	または
H t	32.3以下	

肺機能

%肺活量	79.9以下	または
1 秒率	69.9以下	かつ
% 1 秒量	79.9以下	

肝機能

A S T	51以上	または
A L T	51以上	または
γ G T	101以上	

腎機能

男性		
B U N	26.0以上	または
C r	1.30以上	または
e G F R	49.9以下	

聴力1000H z

左右いずれかが聞こえなかった

女性		
B U N	26.0以上	または
C r	1.00以上	または
e G F R	49.9以下	

聴力4000H z

45歳未満または45歳以上 3 歳節目
左右いずれかが聞こえなかった

炎症反応

C R P	1.00以上
-------	--------

胸部 X 線

要精検 D 1	または
要精検 D 2	または
要精検 D 3	または
要精検 D 4	または
要精検 E 1	または
要精検 E 2	

I 一般健康診断

他地区国保

協会健保健診

協会健保付加健診

労働衛生法に基づく健診

家族の特定健診

雇い入れ時健診


施設や学校の一般健診

市外受託健診

人間ドック、住民健診以外の職域などの健診である。
 受診者数は46,722人で前年度と比較し1,042人増加した。
 各検査項目について有所見者数を報告する。

I - a. 受診者数年次推移

(年度)	H25	H26	H27	H28	H29
男 性	26,597	26,590	26,509	26,903	27,278
女 性	18,020	18,316	18,670	18,777	19,444
計	44,617	44,906	45,179	45,680	46,722




I - b. 項目・年代別有所見者数


①血圧

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	4,429	847	24	3	19.1%	0.5%	12.5%
	30 ～ 39	5,532	1,453	118	15	26.3%	2.1%	12.7%
	40 ～ 49	6,771	2,403	361	72	35.5%	5.3%	19.9%
	50 ～ 59	5,758	2,120	328	84	36.8%	5.7%	25.6%
	60 ～ 69	4,220	1,260	181	42	29.9%	4.3%	23.2%
	70 ～ 79	551	146	22	3	26.5%	4.0%	13.6%
	80 ～	16	8	1	0	50.0%	6.3%	0.0%
	計	27,277	8,237	1,035	219	30.2%	3.8%	21.2%
女性	～ 29	2,966	194	7	1	6.5%	0.2%	14.3%
	30 ～ 39	3,087	328	39	9	10.6%	1.3%	23.1%
	40 ～ 49	5,032	1,000	97	28	19.9%	1.9%	28.9%
	50 ～ 59	4,905	1,240	116	32	25.3%	2.4%	27.6%
	60 ～ 69	2,993	780	79	41	26.1%	2.6%	51.9%
	70 ～ 79	440	106	11	4	24.1%	2.5%	36.4%
	80 ～	19	5	0		26.3%	0.0%	
	計	19,442	3,653	349	115	18.8%	1.8%	33.0%
合計		46,719	11,890	1,384	334	25.5%	3.0%	24.1%

男性




女性




②脂質

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	2,751	979	70	12	35.6%	2.5%	17.1%
	30 ～ 39	4,749	2,763	322	44	58.2%	6.8%	13.7%
	40 ～ 49	6,443	4,147	611	121	64.4%	9.5%	19.8%
	50 ～ 59	5,483	3,350	502	114	61.1%	9.2%	22.7%
	60 ～ 69	4,036	2,163	262	75	53.6%	6.5%	28.6%
	70 ～ 79	528	248	27	14	47.0%	5.1%	51.9%
	80 ～	16	6	0		37.5%	0.0%	
	計	24,006	13,656	1,794	380	56.9%	7.5%	21.2%
女性	～ 29	1,596	321	20	2	20.1%	1.3%	10.0%
	30 ～ 39	2,621	798	114	33	30.4%	4.3%	28.9%
	40 ～ 49	4,969	2,237	249	63	45.0%	5.0%	25.3%
	50 ～ 59	4,843	3,055	475	162	63.1%	9.8%	34.1%
	60 ～ 69	2,975	1,683	241	91	56.6%	8.1%	37.8%
	70 ～ 79	432	202	14	3	46.8%	3.2%	21.4%
	80 ～	19	6	0		31.6%	0.0%	
	計	17,455	8,302	1,113	354	47.6%	6.4%	31.8%
合計		41,461	21,958	2,907	734	53.0%	7.0%	25.2%

男性





女性





③糖代謝

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	4,429	474	35	8	10.7%	0.8%	22.9%
	30～39	5,531	1,393	108	16	25.2%	2.0%	14.8%
	40～49	6,765	2,917	262	65	43.1%	3.9%	24.8%
	50～59	5,756	2,999	391	134	52.1%	6.8%	34.3%
	60～69	4,218	2,285	362	152	54.2%	8.6%	42.0%
	70～79	551	315	57	23	57.2%	10.3%	40.4%
	80～	16	8	2	0	50.0%	12.5%	0.0%
	計	27,266	10,391	1,217	398	38.1%	4.5%	32.7%
女性	～ 29	2,927	152	14	3	5.2%	0.5%	21.4%
	30～39	3,087	340	26	8	11.0%	0.8%	30.8%
	40～49	5,032	1,240	67	18	24.6%	1.3%	26.9%
	50～59	4,905	1,915	117	50	39.0%	2.4%	42.7%
	60～69	2,993	1,611	129	65	53.8%	4.3%	50.4%
	70～79	440	274	19	12	62.3%	4.3%	63.2%
	80～	19	6	2	2	31.6%	10.5%	100.0%
	計	19,403	5,538	374	158	28.5%	1.9%	42.2%
合計		46,669	15,929	1,591	556	34.1%	3.4%	34.9%





④BMI

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	4,429	1,219	27.5%
	30～39	5,530	1,922	34.8%
	40～49	6,771	2,505	37.0%
	50～59	5,755	2,003	34.8%
	60～69	4,220	1,335	31.6%
	70～79	551	185	33.6%
	80～	16	5	31.3%
	計	27,272	9,174	33.6%
女性	～ 29	2,963	483	16.3%
	30～39	3,084	629	20.4%
	40～49	5,028	1,182	23.5%
	50～59	4,903	1,146	23.4%
	60～69	2,993	762	25.5%
	70～79	440	144	32.7%
	80～	19	4	21.1%
	計	19,430	4,350	22.4%
合計		46,702	13,524	29.0%





⑤腹囲

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	2,518	629	25.0%
	30～39	4,608	1,597	34.7%
	40～49	6,405	2,419	37.8%
	50～59	5,468	2,096	38.3%
	60～69	4,035	1,506	37.3%
	70～79	520	214	41.2%
	80～	16	4	25.0%
	計	23,570	8,465	35.9%
女性	～ 29	1,484	108	7.3%
	30～39	2,537	220	8.7%
	40～49	4,935	576	11.7%
	50～59	4,814	589	12.2%
	60～69	2,963	397	13.4%
	70～79	425	68	16.0%
	80～	19	4	21.1%
	計	17,177	1,962	11.4%
合計		40,747	10,427	25.6%





⑥貧血（RBC,Hb,Ht）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	2,805	19	0.7%
	30 ～ 39	4,779	67	1.4%
	40 ～ 49	6,448	189	2.9%
	50 ～ 59	5,488	264	4.8%
	60 ～ 69	4,046	360	8.9%
	70 ～ 79	529	83	15.7%
	80 ～	16	6	37.5%
	計	24,111	988	4.1%
女性	～ 29	1,660	237	14.3%
	30 ～ 39	2,640	543	20.6%
	40 ～ 49	4,861	1,295	26.6%
	50 ～ 59	4,745	551	11.6%
	60 ～ 69	2,901	271	9.3%
	70 ～ 79	417	69	16.5%
	80 ～	19	5	26.3%
	計	17,243	2,971	17.2%
合計		41,354	3,959	9.6%





⑦肝機能（AST,ALT, γ GT）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	2,756	880	31.9%
	30 ～ 39	4,753	2,111	44.4%
	40 ～ 49	6,445	3,300	51.2%
	50 ～ 59	5,483	2,846	51.9%
	60 ～ 69	4,036	1,875	46.5%
	70 ～ 79	528	212	40.2%
	80 ～	16	4	25.0%
	計	24,017	11,228	46.8%
女性	～ 29	1,604	107	6.7%
	30 ～ 39	2,626	230	8.8%
	40 ～ 49	4,970	610	12.3%
	50 ～ 59	4,844	974	20.1%
	60 ～ 69	2,975	604	20.3%
	70 ～ 79	432	77	17.8%
	80 ～	19	0	0.0%
	計	17,470	2,602	14.9%
合計		41,487	13,830	33.3%





⑧聴力1000Hz (30dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	3,765	37	1.0%
	30～ 39	5,475	54	1.0%
	40～ 49	6,720	146	2.2%
	50～ 59	5,710	287	5.0%
	60～ 69	4,182	573	13.7%
	70～ 79	536	145	27.1%
	80～	16	9	56.3%
	計	26,404	1,251	4.7%
女性	～ 29	2,617	20	0.8%
	30～ 39	3,050	34	1.1%
	40～ 49	4,865	72	1.5%
	50～ 59	4,759	170	3.6%
	60～ 69	2,889	278	9.6%
	70～ 79	409	81	19.8%
	80～	19	14	73.7%
	計	18,608	669	3.6%
合計		45,012	1,920	4.3%





⑨聴力4000Hz (40dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	3,765	50	1.3%
	30～ 39	5,475	201	3.7%
	40～ 49	6,720	710	10.6%
	50～ 59	5,710	1,516	26.5%
	60～ 69	4,182	2,051	49.0%
	70～ 79	536	359	67.0%
	80～	16	14	87.5%
	計	26,404	4,901	18.6%
女性	～ 29	2,617	27	1.0%
	30～ 39	3,050	25	0.8%
	40～ 49	4,865	71	1.5%
	50～ 59	4,759	201	4.2%
	60～ 69	2,889	333	11.5%
	70～ 79	409	105	25.7%
	80～	19	14	73.7%
	計	18,608	776	4.2%
合計		45,012	5,677	12.6%





⑩胸部X線

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	4,147	28	0.7%
	30～ 39	5,207	104	2.0%
	40～ 49	6,376	252	4.0%
	50～ 59	5,360	346	6.5%
	60～ 69	3,880	414	10.7%
	70～ 79	504	97	19.2%
	80～	16	4	25.0%
	計	25,490	1,245	4.9%
女性	～ 29	2,858	14	0.5%
	30～ 39	2,960	32	1.1%
	40～ 49	4,843	123	2.5%
	50～ 59	4,748	201	4.2%
	60～ 69	2,896	227	7.8%
	70～ 79	424	48	11.3%
	80～	19	2	10.5%
	計	18,748	647	3.5%
合計		44,238	1,892	4.3%





⑪喀痰

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	1	0	0.0%
	30～ 39	2	0	0.0%
	40～ 49	8	0	0.0%
	50～ 59	18	0	0.0%
	60～ 69	31	0	0.0%
	70～ 79	5	0	0.0%
	80～	0		
	計	65	0	0.0%
女性	～ 29	0		
	30～ 39	0		
	40～ 49	0		
	50～ 59	2	0	0.0%
	60～ 69	0		
	70～ 79	0		
	80～	0		
	計	2	0	0.0%
合計		67	0	0.0%





⑫心電図

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	2,477	1,344	54.3%
	30～39	4,597	2,115	46.0%
	40～49	6,323	2,815	44.5%
	50～59	5,441	2,765	50.8%
	60～69	3,999	2,320	58.0%
	70～79	524	366	69.8%
	80～	16	15	93.8%
	計	23,377	11,740	50.2%
女性	～ 29	1,537	721	46.9%
	30～39	2,562	975	38.1%
	40～49	4,831	1,512	31.3%
	50～59	4,734	1,930	40.8%
	60～69	2,896	1,448	50.0%
	70～79	416	242	58.2%
	80～	19	12	63.2%
	計	16,995	6,840	40.2%
合計		40,372	18,580	46.0%





⑬眼底

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	112	7	6.3%
	30～39	348	44	12.6%
	40～49	1,127	173	15.4%
	50～59	974	194	19.9%
	60～69	537	123	22.9%
	70～79	59	24	40.7%
	80～	4	1	25.0%
	計	3,161	566	17.9%
女性	～ 29	20	1	5.0%
	30～39	109	11	10.1%
	40～49	383	53	13.8%
	50～59	486	84	17.3%
	60～69	225	46	20.4%
	70～79	34	8	23.5%
	80～	2	0	0.0%
	計	1,259	203	16.1%
合計		4,420	769	17.4%





⑭眼圧

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	27	0	0.0%
	30 ～ 39	166	3	1.8%
	40 ～ 49	479	8	1.7%
	50 ～ 59	439	8	1.8%
	60 ～ 69	317	8	2.5%
	70 ～ 79	47	0	0.0%
	80 ～	3	0	0.0%
	計	1,478	27	1.8%
女性	～ 29	16	1	6.3%
	30 ～ 39	76	0	0.0%
	40 ～ 49	221	6	2.7%
	50 ～ 59	279	0	0.0%
	60 ～ 69	160	2	1.3%
	70 ～ 79	23	1	4.3%
	80 ～	0		
	計	775	10	1.3%
合計		2,253	37	1.6%





⑮尿糖

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	4,428	27	0.6%
	30 ～ 39	5,529	102	1.8%
	40 ～ 49	6,761	214	3.2%
	50 ～ 59	5,749	280	4.9%
	60 ～ 69	4,217	230	5.5%
	70 ～ 79	550	32	5.8%
	80 ～	16	0	0.0%
	計	27,250	885	3.2%
女性	～ 29	2,925	14	0.5%
	30 ～ 39	3,087	13	0.4%
	40 ～ 49	5,031	44	0.9%
	50 ～ 59	4,904	55	1.1%
	60 ～ 69	2,993	37	1.2%
	70 ～ 79	439	2	0.5%
	80 ～	19	1	5.3%
	計	19,398	166	0.9%
合計		46,648	1,051	2.3%





⑩尿蛋白

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	4,428	460	10.4%
	30～39	5,529	496	9.0%
	40～49	6,761	908	13.4%
	50～59	5,749	861	15.0%
	60～69	4,217	685	16.2%
	70～79	550	94	17.1%
	80～	16	8	50.0%
	計	27,250	3,512	12.9%
女性	～ 29	2,925	260	8.9%
	30～39	3,087	271	8.8%
	40～49	5,031	420	8.3%
	50～59	4,904	358	7.3%
	60～69	2,993	171	5.7%
	70～79	439	38	8.7%
	80～	19	1	5.3%
	計	19,398	1,519	7.8%
合計		46,648	5,031	10.8%





⑪尿潜血

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	4,405	81	1.8%
	30～39	5,496	214	3.9%
	40～49	6,735	394	5.9%
	50～59	5,736	424	7.4%
	60～69	4,191	380	9.1%
	70～79	544	52	9.6%
	80～	15	1	6.7%
	計	27,122	1,546	5.7%
女性	～ 29	2,888	408	14.1%
	30～39	3,039	566	18.6%
	40～49	4,854	1,121	23.1%
	50～59	4,776	1,071	22.4%
	60～69	2,913	696	23.9%
	70～79	422	98	23.2%
	80～	19	5	26.3%
	計	18,911	3,965	21.0%
合計		46,033	5,511	12.0%





⑮肺機能

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	28	2	7.1%
	30 ～ 39	129	3	2.3%
	40 ～ 49	525	12	2.3%
	50 ～ 59	483	16	3.3%
	60 ～ 69	241	23	9.5%
	70 ～ 79	26	3	11.5%
	80 ～	2	2	100.0%
	計	1,434	61	4.3%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	52	0	0.0%
	40 ～ 49	262	7	2.7%
	50 ～ 59	298	4	1.3%
	60 ～ 69	83	4	4.8%
	70 ～ 79	7	0	0.0%
	80 ～	0		
	計	702	15	2.1%
合計		2,136	76	3.6%





⑯腎機能 (BUN,Cr,eGFR)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	227	34	15.0%
	30 ～ 39	2,257	348	15.4%
	40 ～ 49	4,708	833	17.7%
	50 ～ 59	4,008	793	19.8%
	60 ～ 69	2,855	766	26.8%
	70 ～ 79	345	141	40.9%
	80 ～	7	3	42.9%
	計	14,407	2,918	20.3%
女性	～ 29	113	37	32.7%
	30 ～ 39	1,182	377	31.9%
	40 ～ 49	2,951	1,005	34.1%
	50 ～ 59	2,780	954	34.3%
	60 ～ 69	1,374	431	31.4%
	70 ～ 79	129	45	34.9%
	80 ～	1	0	0.0%
	計	8,530	2,849	33.4%
合計		22,937	5,767	25.1%



②⑩炎症反応（CRP）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	3	0	0.0%
	30 ～ 39	118	8	6.8%
	40 ～ 49	419	29	6.9%
	50 ～ 59	369	17	4.6%
	60 ～ 69	253	12	4.7%
	70 ～ 79	27	2	7.4%
	80 ～	3	1	33.3%
	計	1,192	69	5.8%
女性	～ 29	1	1	100.0%
	30 ～ 39	57	2	3.5%
	40 ～ 49	207	7	3.4%
	50 ～ 59	232	6	2.6%
	60 ～ 69	88	6	6.8%
	70 ～ 79	8	1	12.5%
	80 ～	0		
	計	593	23	3.9%
合計		1,785	92	5.2%



Ⅱ－１ 地域住民（八戸市）

八戸市国保加入者健診
(国保ドック・住民健診)
八戸市後期高齢者健診
八戸市骨粗鬆症健診


八戸市の住民健診である。

受診者数は16,850人だった。

各検査項目について有所見者数を報告する。

Ⅱ－１－a. 受診者数年次推移

（年度）	H25	H26	H27	H28	H29
男 性	7,840	8,145	8,151	7,909	7,580
女 性	9,718	9,927	9,997	9,780	9,270
計	17,558	18,072	18,148	17,689	16,850




Ⅱ－１－b. 項目・年代別有所見者数


①血圧

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	89	18	0		20.2%	0.0%	
	40～49	355	118	15	6	33.2%	4.2%	40.0%
	50～59	481	168	30	8	34.9%	6.2%	26.7%
	60～69	2,414	664	75	32	27.5%	3.1%	42.7%
	70～79	3,320	790	61	34	23.8%	1.8%	55.7%
	80～	921	216	31	17	23.5%	3.4%	54.8%
	計	7,580	1,974	212	97	26.0%	2.8%	45.8%
女性	30～39	104	8	2	0	7.7%	1.9%	0.0%
	40～49	396	65	5	4	16.4%	1.3%	80.0%
	50～59	644	146	12	8	22.7%	1.9%	66.7%
	60～69	3,387	815	53	33	24.1%	1.6%	62.3%
	70～79	3,976	916	68	43	23.0%	1.7%	63.2%
	80～	763	179	11	6	23.5%	1.4%	54.5%
	計	9,270	2,129	151	94	23.0%	1.6%	62.3%
合計		16,850	4,103	363	191	24.4%	2.2%	52.6%

男性




女性




②脂質

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	89	47	3	1	52.8%	3.4%	33.3%
	40～49	355	229	32	8	64.5%	9.0%	25.0%
	50～59	481	283	36	12	58.8%	7.5%	33.3%
	60～69	2,414	1,150	97	46	47.6%	4.0%	47.4%
	70～79	3,320	1,336	69	37	40.2%	2.1%	53.6%
	80～	921	340	13	8	36.9%	1.4%	61.5%
	計	7,580	3,385	250	112	44.7%	3.3%	44.8%
女性	30～39	104	23	4	2	22.1%	3.8%	50.0%
	40～49	396	151	9	4	38.1%	2.3%	44.4%
	50～59	644	357	40	20	55.4%	6.2%	50.0%
	60～69	3,387	1,671	178	101	49.3%	5.3%	56.7%
	70～79	3,975	1,661	115	77	41.8%	2.9%	67.0%
	80～	763	316	19	11	41.4%	2.5%	57.9%
	計	9,269	4,179	365	215	45.1%	3.9%	58.9%
合計		16,849	7,564	615	327	44.9%	3.7%	53.2%

男性




女性




③糖代謝

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	89	35	0		39.3%	0.0%	
	40～49	355	211	15	6	59.4%	4.2%	40.0%
	50～59	481	316	30	12	65.7%	6.2%	40.0%
	60～69	2,414	1,636	195	121	67.8%	8.1%	62.1%
	70～79	3,320	2,227	264	170	67.1%	8.0%	64.4%
	80～	921	629	74	50	68.3%	8.0%	67.6%
	計	7,580	5,054	578	359	66.7%	7.6%	62.1%
女性	30～39	83	22	1	1	26.5%	1.2%	100.0%
	40～49	396	162	8	6	40.9%	2.0%	75.0%
	50～59	644	420	22	14	65.2%	3.4%	63.6%
	60～69	3,387	2,466	153	112	72.8%	4.5%	73.2%
	70～79	3,975	2,957	195	150	74.4%	4.9%	76.9%
	80～	763	545	46	35	71.4%	6.0%	76.1%
	計	9,248	6,572	425	318	71.1%	4.6%	74.8%
合計		16,828	11,626	1,003	677	69.1%	6.0%	67.5%

男性





女性





④BMI

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	26	29.2%
	40～49	355	142	40.0%
	50～59	481	169	35.1%
	60～69	2,414	756	31.3%
	70～79	3,320	1,000	30.1%
	80～	921	250	27.1%
	計	7,580	2,343	30.9%
女性	30～39	104	24	23.1%
	40～49	396	79	19.9%
	50～59	644	142	22.0%
	60～69	3,387	828	24.4%
	70～79	3,976	1,036	26.1%
	80～	763	215	28.2%
	計	9,270	2,324	25.1%
合計		16,850	4,667	27.7%





⑤腹囲

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	40～49	355	158	44.5%
	50～59	481	191	39.7%
	60～69	2,396	883	36.9%
	70～79	2,748	993	36.1%
	80～	329	121	36.8%
	計	6,309	2,346	37.2%
女性	40～49	396	41	10.4%
	50～59	644	80	12.4%
	60～69	3,362	396	11.8%
	70～79	3,279	436	13.3%
	80～	228	43	18.9%
	計	7,909	996	12.6%
合計		14,218	3,342	23.5%





⑥貧血 (RBC,Hb,Ht)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	1	1.1%
	40～49	355	8	2.3%
	50～59	481	28	5.8%
	60～69	2,397	253	10.6%
	70～79	2,761	470	17.0%
	80～	335	110	32.8%
	計	6,418	870	13.6%
女性	30～39	104	22	21.2%
	40～49	396	114	28.8%
	50～59	644	65	10.1%
	60～69	3,362	373	11.1%
	70～79	3,288	572	17.4%
	80～	235	68	28.9%
	計	8,029	1,214	15.1%
合計		14,447	2,084	14.4%





⑦肝機能 (AST,ALT, γ GT)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	36	40.4%
	40～49	355	183	51.5%
	50～59	481	244	50.7%
	60～69	2,414	1,107	45.9%
	70～79	3,320	1,267	38.2%
	80～	921	270	29.3%
	計	7,580	3,107	41.0%
女性	30～39	83	9	10.8%
	40～49	396	60	15.2%
	50～59	644	128	19.9%
	60～69	3,387	643	19.0%
	70～79	3,975	676	17.0%
	80～	763	138	18.1%
	計	9,248	1,654	17.9%
合計		16,828	4,761	28.3%





⑧聴力 1000Hz(30dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	1	1.1%
	40～49	352	7	2.0%
	50～59	478	14	2.9%
	60～69	2,353	341	14.5%
	70～79	2,649	763	28.8%
	80～	313	138	44.1%
	計	6,234	1,264	20.3%
女性	30～39	83	2	2.4%
	40～49	395	10	2.5%
	50～59	640	31	4.8%
	60～69	3,319	356	10.7%
	70～79	3,173	691	21.8%
	80～	225	115	51.1%
	計	7,835	1,205	15.4%
合計		14,069	2,469	17.5%





⑨聴力 4000Hz(40dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	3	3.4%
	40～49	352	37	10.5%
	50～59	478	125	26.2%
	60～69	2,353	1,205	51.2%
	70～79	2,649	1,754	66.2%
	80～	313	253	80.8%
	計	6,234	3,377	54.2%
女性	30～39	83	2	2.4%
	40～49	395	12	3.0%
	50～59	640	21	3.3%
	60～69	3,319	421	12.7%
	70～79	3,173	864	27.2%
	80～	225	138	61.3%
	計	7,835	1,458	18.6%
合計		14,069	4,835	34.4%





⑩胸部X線

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	3	3.4%
	40～49	324	10	3.1%
	50～59	448	35	7.8%
	60～69	2,229	235	10.5%
	70～79	3,165	592	18.7%
	80～	879	245	27.9%
	計	7,134	1,120	15.7%
女性	30～39	83	1	1.2%
	40～49	348	12	3.4%
	50～59	553	26	4.7%
	60～69	3,121	286	9.2%
	70～79	3,775	460	12.2%
	80～	715	115	16.1%
	計	8,595	900	10.5%
合計		15,729	2,020	12.8%





⑪喀痰

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	40～49	1	0	0.0%
	50～59	16	0	0.0%
	60～69	129	0	0.0%
	70～79	162	1	0.6%
	80～	53	1	1.9%
	計	361	2	0.6%
女性	40～49	1	0	0.0%
	50～59	6	0	0.0%
	60～69	14	0	0.0%
	70～79	12	0	0.0%
	80～	2	0	0.0%
	計	35	0	0.0%
合計		396	2	0.5%





⑫心電図

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	40	44.9%
	40～49	355	167	47.0%
	50～59	481	230	47.8%
	60～69	2,396	1,440	60.1%
	70～79	2,758	1,934	70.1%
	80～	340	272	80.0%
	計	6,419	4,083	63.6%
女性	30～39	83	26	31.3%
	40～49	396	133	33.6%
	50～59	644	268	41.6%
	60～69	3,367	1,681	49.9%
	70～79	3,290	1,954	59.4%
	80～	245	178	72.7%
	計	8,025	4,240	52.8%
合計		14,444	8,323	57.6%





⑬眼底

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	8	9.0%
	40～49	306	43	14.1%
	50～59	401	100	24.9%
	60～69	2,066	584	28.3%
	70～79	2,553	822	32.2%
	80～	327	133	40.7%
	計	5,742	1,690	29.4%
女性	30～39	83	10	12.0%
	40～49	329	39	11.9%
	50～59	518	91	17.6%
	60～69	2,829	684	24.2%
	70～79	2,927	917	31.3%
	80～	229	101	44.1%
	計	6,915	1,842	26.6%
合計		12,657	3,532	27.9%





⑭眼圧

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	88	2	2.3%
	40～49	306	6	2.0%
	50～59	401	6	1.5%
	60～69	2,067	42	2.0%
	70～79	2,551	37	1.5%
	80～	322	5	1.6%
	計	5,735	98	1.7%
女性	30～39	83	1	1.2%
	40～49	329	3	0.9%
	50～59	517	4	0.8%
	60～69	2,833	26	0.9%
	70～79	2,923	29	1.0%
	80～	225	4	1.8%
	計	6,910	67	1.0%
合計		12,645	165	1.3%





⑮尿糖

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	1	1.1%
	40～49	355	10	2.8%
	50～59	481	22	4.6%
	60～69	2,412	103	4.3%
	70～79	3,317	111	3.3%
	80～	916	31	3.4%
	計	7,570	278	3.7%
女性	30～39	104	2	1.9%
	40～49	396	3	0.8%
	50～59	644	8	1.2%
	60～69	3,386	38	1.1%
	70～79	3,972	33	0.8%
	80～	762	7	0.9%
	計	9,264	91	1.0%
合計		16,834	369	2.2%





⑩尿蛋白

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	2	2.2%
	40～49	355	47	13.2%
	50～59	481	64	13.3%
	60～69	2,412	380	15.8%
	70～79	3,317	586	17.7%
	80～	916	238	26.0%
	計	7,570	1,317	17.4%
女性	30～39	104	4	3.8%
	40～49	396	30	7.6%
	50～59	644	33	5.1%
	60～69	3,386	190	5.6%
	70～79	3,972	296	7.5%
	80～	762	125	16.4%
	計	9,264	678	7.3%
合計		16,834	1,995	11.9%





⑪尿潜血

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	2	2.2%
	40～49	355	27	7.6%
	50～59	481	32	6.7%
	60～69	2,394	205	8.6%
	70～79	2,746	275	10.0%
	80～	329	40	12.2%
	計	6,394	581	9.1%
女性	30～39	83	12	14.5%
	40～49	396	92	23.2%
	50～59	644	135	21.0%
	60～69	3,361	753	22.4%
	70～79	3,276	741	22.6%
	80～	227	64	28.2%
	計	7,987	1,797	22.5%
合計		14,381	2,378	16.5%





⑮肺機能

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	1	0	0.0%
	40～49	2	0	0.0%
	50～59	3	0	0.0%
	60～69	11	2	18.2%
	70～79	21	4	19.0%
	80～	18	7	38.9%
	計	56	13	23.2%
女性	30～39	0		
	40～49	1	0	0.0%
	50～59	1	0	0.0%
	60～69	5	0	0.0%
	70～79	3	0	0.0%
	80～	1	0	0.0%
	計	11	0	0.0%
合計		67	13	19.4%





⑯腎機能 (BUN,Cr,eGFR)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	89	13	14.6%
	40～49	355	60	16.9%
	50～59	481	91	18.9%
	60～69	2,396	723	30.2%
	70～79	2,751	1,262	45.9%
	80～	333	207	62.2%
	計	6,405	2,356	36.8%
女性	30～39	83	25	30.1%
	40～49	396	122	30.8%
	50～59	644	219	34.0%
	60～69	3,362	1,125	33.5%
	70～79	3,279	1,337	40.8%
	80～	229	135	59.0%
	計	7,993	2,963	37.1%
合計		14,398	5,319	36.9%



②⑩炎症反応 (CRP)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	0		
	40～49	1	0	0.0%
	50～59	2	0	0.0%
	60～69	10	3	30.0%
	70～79	18	3	16.7%
	80～	21	2	9.5%
	計	52	8	15.4%
女性	30～39	0		
	40～49	3	0	0.0%
	50～59	0	0	0.0%
	60～69	9	0	0.0%
	70～79	5	0	0.0%
	80～	3	0	0.0%
	計	20	0	0.0%
合計		72	8	11.1%



Ⅱ－２ 地域住民（階上町）

階上町国保加入者健診
(国保ドック・住民健診)
階上町後期高齢者健診


階上町の住民健診である。

受診者数は1,056人であった。

各検査項目について有所見者数を報告する。

Ⅱ－２－a. 受診者数年次推移

(年度)	H25	H26	H27	H28	H29
男 性	504	490	516	518	508
女 性	541	552	560	604	548
計	1,045	1,042	1,076	1,122	1,056




Ⅱ－２－b. 項目・年代別有所見者数


①血圧

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	6	0	0		0.0%	0.0%	
	40～49	26	7	0		26.9%	0.0%	
	50～59	51	14	2	1	27.5%	3.9%	50.0%
	60～69	208	54	4	1	26.0%	1.9%	25.0%
	70～79	183	47	6	5	25.7%	3.3%	83.3%
	80～	34	7	0		20.6%	0.0%	
	計	508	129	12	7	25.4%	2.4%	58.3%
女性	30～39	3	1	0		33.3%	0.0%	
	40～49	25	5	1	0	20.0%	4.0%	0.0%
	50～59	52	15	2	1	28.8%	3.8%	50.0%
	60～69	244	63	3	0	25.8%	1.2%	0.0%
	70～79	197	44	3	1	22.3%	1.5%	33.3%
	80～	27	5	2	1	18.5%	7.4%	50.0%
	計	548	133	11	3	24.3%	2.0%	27.3%
合計		1,056	262	23	10	24.8%	2.2%	43.5%

男性




女性




②脂質

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	6	4	0		66.7%	0.0%	
	40～49	26	12	2	0	46.2%	7.7%	0.0%
	50～59	51	28	3	0	54.9%	5.9%	0.0%
	60～69	208	107	8	3	51.4%	3.8%	37.5%
	70～79	183	82	4	2	44.8%	2.2%	50.0%
	80～	34	8	0		23.5%	0.0%	
	計	508	241	17	5	47.4%	3.3%	29.4%
女性	30～39	3	0	0		0.0%	0.0%	
	40～49	25	9	1	0	36.0%	4.0%	0.0%
	50～59	52	30	7	1	57.7%	13.5%	14.3%
	60～69	244	128	13	9	52.5%	5.3%	69.2%
	70～79	197	92	3	1	46.7%	1.5%	33.3%
	80～	27	11	0		40.7%	0.0%	
	計	548	270	24	11	49.3%	4.4%	45.8%
合計		1,056	511	41	16	48.4%	3.9%	39.0%

男性




女性




③糖代謝

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	30～39	6	4	0		66.7%	0.0%	
	40～49	26	12	2	1	46.2%	7.7%	50.0%
	50～59	51	33	1	0	64.7%	2.0%	0.0%
	60～69	208	137	18	9	65.9%	8.7%	50.0%
	70～79	183	125	13	7	68.3%	7.1%	53.8%
	80～	34	27	4	3	79.4%	11.8%	75.0%
	計	508	338	38	20	66.5%	7.5%	52.6%
女性	30～39	3	0	0		0.0%	0.0%	
	40～49	25	8	0		32.0%	0.0%	
	50～59	52	36	2	2	69.2%	3.8%	100.0%
	60～69	244	173	13	8	70.9%	5.3%	61.5%
	70～79	197	135	9	4	68.5%	4.6%	44.4%
	80～	27	22	3	3	81.5%	11.1%	100.0%
	計	548	374	27	17	68.2%	4.9%	63.0%
合計		1,056	712	65	37	67.4%	6.2%	56.9%

男性





女性





④BMI

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	2	33.3%
	40～49	26	10	38.5%
	50～59	51	18	35.3%
	60～69	208	67	32.2%
	70～79	183	66	36.1%
	80～	34	9	26.5%
	計	508	172	33.9%
女性	30～39	3	1	33.3%
	40～49	25	5	20.0%
	50～59	52	13	25.0%
	60～69	244	79	32.4%
	70～79	197	60	30.5%
	80～	27	9	33.3%
	計	548	167	30.5%
合計		1,056	339	32.1%





⑤腹囲

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	40～49	26	7	26.9%
	50～59	51	20	39.2%
	60～69	208	82	39.4%
	70～	127	50	39.4%
	計	412	159	38.6%
女性	40～49	25	3	12.0%
	50～59	52	7	13.5%
	60～69	237	35	14.8%
	70～	127	18	14.2%
	計	441	63	14.3%
合計		853	222	26.0%





⑥貧血 (RBC,Hb,Ht)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	0	0.0%
	50～59	51	5	9.8%
	60～69	208	21	10.1%
	70～79	183	25	13.7%
	80～	34	11	32.4%
	計	508	62	12.2%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	7	28.0%
	50～59	52	10	19.2%
	60～69	244	33	13.5%
	70～79	197	27	13.7%
	80～	27	10	37.0%
	計	548	87	15.9%
合計		1,056	149	14.1%





⑦肝機能 (AST,ALT, γ GT)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	3	50.0%
	40～49	26	17	65.4%
	50～59	51	28	54.9%
	60～69	208	104	50.0%
	70～79	183	69	37.7%
	80～	34	6	17.6%
	計	508	227	44.7%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	2	8.0%
	50～59	52	10	19.2%
	60～69	244	43	17.6%
	70～79	197	31	15.7%
	80～	27	4	14.8%
	計	548	90	16.4%
合計		1,056	317	30.0%





⑧聴力 1000Hz(30dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	1	3.8%
	50～59	51	2	3.9%
	60～69	204	53	26.0%
	70～79	179	62	34.6%
	80～	32	13	40.6%
	計	498	131	26.3%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	2	8.0%
	50～59	52	3	5.8%
	60～69	238	41	17.2%
	70～79	193	58	30.1%
	80～	25	15	60.0%
	計	536	119	22.2%
合計		1,034	250	24.2%





⑨聴力 4000Hz(40dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	4	15.4%
	50～59	51	27	52.9%
	60～69	204	138	67.6%
	70～79	179	127	70.9%
	80～	32	27	84.4%
	計	498	323	64.9%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	1	4.0%
	50～59	52	2	3.8%
	60～69	238	36	15.1%
	70～79	193	63	32.6%
	80～	25	17	68.0%
	計	536	119	22.2%
合計		1,034	442	42.7%





⑩胸部X線

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	23	1	4.3%
	50～59	49	8	16.3%
	60～69	197	21	10.7%
	70～79	177	33	18.6%
	80～	33	7	21.2%
	計	485	70	14.4%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	24	1	4.2%
	50～59	48	4	8.3%
	60～69	228	20	8.8%
	70～79	190	20	10.5%
	80～	26	3	11.5%
	計	519	48	9.2%
合計		1,004	118	11.8%





⑪喀痰

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	50～59	3	0	0.0%
	60～69	11	0	0.0%
	70～79	12	0	0.0%
	80～	1	0	0.0%
	計	27	0	0.0%
女性	50～59	0		
	60～69	1	0	0.0%
	70～79	2	0	0.0%
	80～	0		
	計	3	0	0.0%
合計		30	0	0.0%





⑫心電図

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	2	33.3%
	40～49	26	16	61.5%
	50～59	51	28	54.9%
	60～69	208	132	63.5%
	70～79	183	130	71.0%
	80～	34	25	73.5%
	計	508	333	65.6%
女性	30～39	3	1	33.3%
	40～49	25	9	36.0%
	50～59	52	18	34.6%
	60～69	244	127	52.0%
	70～79	197	112	56.9%
	80～	27	21	77.8%
	計	548	288	52.6%
合計		1,056	621	58.8%





⑬眼底

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	1	16.7%
	40～49	26	9	34.6%
	50～59	51	9	17.6%
	60～69	206	66	32.0%
	70～79	183	53	29.0%
	80～	34	13	38.2%
	計	506	151	29.8%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	4	16.0%
	50～59	51	10	19.6%
	60～69	241	63	26.1%
	70～79	194	81	41.8%
	80～	25	12	48.0%
	計	539	170	31.5%
合計		1,045	321	30.7%





⑭眼圧

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	2	7.7%
	50～59	51	0	0.0%
	60～69	205	3	1.5%
	70～79	183	3	1.6%
	80～	34	0	0.0%
	計	505	8	1.6%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	0	0.0%
	50～59	51	0	0.0%
	60～69	241	4	1.7%
	70～79	194	5	2.6%
	80～	25	1	4.0%
	計	539	10	1.9%
合計		1,044	18	1.7%





⑮尿糖

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	2	7.7%
	50～59	51	0	0.0%
	60～69	208	15	7.2%
	70～79	183	6	3.3%
	80～	34	2	5.9%
	計	508	25	4.9%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	1	4.0%
	50～59	52	1	1.9%
	60～69	244	1	0.4%
	70～79	197	4	2.0%
	80～	27	0	0.0%
	計	548	7	1.3%
合計		1,056	32	3.0%





⑩尿蛋白

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	0	0.0%
	40～49	26	5	19.2%
	50～59	51	6	11.8%
	60～69	208	25	12.0%
	70～79	183	28	15.3%
	80～	34	10	29.4%
	計	508	74	14.6%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	4	16.0%
	50～59	52	3	5.8%
	60～69	244	12	4.9%
	70～79	197	18	9.1%
	80～	27	7	25.9%
	計	548	44	8.0%
合計		1,056	118	11.2%



⑪尿潜血

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	1	16.7%
	40～49	26	0	0.0%
	50～59	51	2	3.9%
	60～69	208	22	10.6%
	70～79	183	15	8.2%
	80～	34	7	20.6%
	計	508	47	9.3%
女性	30～39	3	0	0.0%
	40～49	25	7	28.0%
	50～59	52	17	32.7%
	60～69	244	61	25.0%
	70～79	197	43	21.8%
	80～	27	5	18.5%
	計	548	133	24.3%
合計		1,056	180	17.0%





⑱肺機能

	受診者	有所見者	有所見率
合計	0		

⑲腎機能 (BUN,Cr,eGFR)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	30～39	6	1	16.7%
	40～49	26	7	26.9%
	50～59	51	11	21.6%
	60～69	208	58	27.9%
	70～79	183	79	43.2%
	80～	34	23	67.6%
	計	508	179	35.2%
女性	30～39	3	1	33.3%
	40～49	25	5	20.0%
	50～59	52	21	40.4%
	60～69	244	81	33.2%
	70～79	197	78	39.6%
	80～	27	13	48.1%
	計	548	199	36.3%
合計		1,056	378	35.8%



⑳炎症反応 (CRP)

	受診者	有所見者	有所見率
合計	0		


Ⅲ 人間ドック

受診者数は3,988人だった。

各検査項目について有所見者数を報告する。

Ⅲ－a. 受診者数年次推移



(年度)	H25	H26	H27	H28	H29
男 性	2,643	2,552	2,553	2,491	2,507
女 性	1,600	1,528	1,565	1,534	1,481
計	4,243	4,080	4,118	4,025	3,988



Ⅲ－b. 項目・年代別有所見者数



①血圧

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	7	0	0		0.0%	0.0%	
	30 ～ 39	185	33	3	2	17.8%	1.6%	66.7%
	40 ～ 49	642	157	19	4	24.5%	3.0%	21.1%
	50 ～ 59	943	240	33	12	25.5%	3.5%	36.4%
	60 ～ 69	629	162	18	8	25.8%	2.9%	44.4%
	70 ～ 79	86	12	0		14.0%	0.0%	
	80 ～	14	1	0		7.1%	0.0%	
	計	2,506	605	73	26	24.1%	2.9%	35.6%
女性	～ 29	0	0	0		0.0%	0.0%	
	30 ～ 39	117	7	0		6.0%	0.0%	
	40 ～ 49	485	59	6	3	12.2%	1.2%	50.0%
	50 ～ 59	572	87	8	3	15.2%	1.4%	37.5%
	60 ～ 69	256	45	0	0	17.6%	0.0%	
	70 ～ 79	47	15	1	1	31.9%	2.1%	100.0%
	80 ～	4	0	0		0.0%	0.0%	
	計	1,481	213	15	7	14.4%	1.0%	46.7%
合計		3,987	818	88	33	20.5%	2.2%	37.5%





②脂質

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	7	3	0		42.9%	0.0%	
	30 ～ 39	185	101	15	5	54.6%	8.1%	33.3%
	40 ～ 49	642	421	58	14	65.6%	9.0%	24.1%
	50 ～ 59	943	581	75	23	61.6%	8.0%	30.7%
	60 ～ 69	629	344	24	11	54.7%	3.8%	45.8%
	70 ～ 79	87	38	3	3	43.7%	3.4%	100.0%
	80 ～	14	8	2	2	57.1%	14.3%	100.0%
	計	2,507	1,496	177	58	59.7%	7.1%	32.8%
女性	～ 29	0	0	0		0.0%	0.0%	
	30 ～ 39	117	42	5	2	35.9%	4.3%	40.0%
	40 ～ 49	485	217	32	7	44.7%	6.6%	21.9%
	50 ～ 59	572	381	50	20	66.6%	8.7%	40.0%
	60 ～ 69	256	154	26	10	60.2%	10.2%	38.5%
	70 ～ 79	47	24	1	0	51.1%	2.1%	0.0%
	80 ～	4	1	0		25.0%	0.0%	
	計	1,481	819	114	39	55.3%	7.7%	34.2%
合計		3,988	2,315	291	97	58.0%	7.3%	33.3%





③糖代謝

	年代	受診者	有所見者	要精検者	精検受診者	有所見率	要精検率	精検受診率
男性	～ 29	7	1	0		14.3%	0.0%	
	30 ～ 39	185	100	2	2	54.1%	1.1%	100.0%
	40 ～ 49	642	435	25	7	67.8%	3.9%	28.0%
	50 ～ 59	943	702	80	28	74.4%	8.5%	35.0%
	60 ～ 69	629	452	45	23	71.9%	7.2%	51.1%
	70 ～ 79	87	59	5	3	67.8%	5.7%	60.0%
	80 ～	14	11	2	1	78.6%	14.3%	50.0%
	計	2,507	1,760	159	64	70.2%	6.3%	40.3%
女性	～ 29	0	0	0		0.0%	0.0%	
	30 ～ 39	117	40	0	0	34.2%	0.0%	
	40 ～ 49	485	212	2	1	43.7%	0.4%	50.0%
	50 ～ 59	572	399	18	5	69.8%	3.1%	27.8%
	60 ～ 69	256	193	11	8	75.4%	4.3%	72.7%
	70 ～ 79	47	36	4	4	76.6%	8.5%	100.0%
	80 ～	4	3	0		75.0%	0.0%	
	計	1,481	883	35	18	59.6%	2.4%	51.4%
合計		3,988	2,643	194	82	66.3%	4.9%	42.3%





④BMI

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	2	28.6%
	30 ～ 39	185	71	38.4%
	40 ～ 49	642	272	42.4%
	50 ～ 59	943	363	38.5%
	60 ～ 69	629	227	36.1%
	70 ～ 79	87	28	32.2%
	80 ～	14	3	21.4%
	計	2,507	966	38.5%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	20	17.1%
	40 ～ 49	485	92	19.0%
	50 ～ 59	572	147	25.7%
	60 ～ 69	256	65	25.4%
	70 ～ 79	47	13	27.7%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,481	338	22.8%
合計		3,988	1,304	32.7%





⑤腹囲

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	2	28.6%
	30 ～ 39	185	72	38.9%
	40 ～ 49	642	274	42.7%
	50 ～ 59	943	397	42.1%
	60 ～ 69	629	278	44.2%
	70 ～ 79	86	41	47.7%
	80 ～	14	6	42.9%
	計	2,506	1,070	42.7%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	116	11	9.5%
	40 ～ 49	485	45	9.3%
	50 ～ 59	572	76	13.3%
	60 ～ 69	256	30	11.7%
	70 ～ 79	47	5	10.6%
	80 ～	4	0	0.0%
	計	1,480	167	11.3%
合計		3,986	1,237	31.0%





⑥貧血（RBC,Hb,Ht）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	1	0.5%
	40 ～ 49	642	17	2.6%
	50 ～ 59	943	37	3.9%
	60 ～ 69	629	39	6.2%
	70 ～ 79	87	14	16.1%
	80 ～	14	3	21.4%
	計	2,507	111	4.4%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	18	15.4%
	40 ～ 49	485	133	27.4%
	50 ～ 59	572	49	8.6%
	60 ～ 69	256	25	9.8%
	70 ～ 79	47	10	21.3%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,481	236	15.9%
合計		3,988	347	8.7%





⑦肝機能（AST,ALT, γ GT）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	2	28.6%
	30 ～ 39	185	82	44.3%
	40 ～ 49	642	334	52.0%
	50 ～ 59	943	499	52.9%
	60 ～ 69	629	283	45.0%
	70 ～ 79	87	32	36.8%
	80 ～	14	4	28.6%
	計	2,507	1,236	49.3%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	13	11.1%
	40 ～ 49	485	56	11.5%
	50 ～ 59	572	128	22.4%
	60 ～ 69	256	50	19.5%
	70 ～ 79	47	9	19.1%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,481	257	17.4%
合計		3,988	1,493	37.4%





⑧聴力1000Hz (30dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	1	0.5%
	40 ～ 49	640	14	2.2%
	50 ～ 59	936	37	4.0%
	60 ～ 69	617	43	7.0%
	70 ～ 79	83	27	32.5%
	80 ～	14	5	35.7%
	計	2,482	127	5.1%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	0	0.0%
	40 ～ 49	483	3	0.6%
	50 ～ 59	570	10	1.8%
	60 ～ 69	254	23	9.1%
	70 ～ 79	46	10	21.7%
	80 ～	4	3	75.0%
	計	1,474	49	3.3%
合計		3,956	176	4.4%





⑨聴力4000Hz (40dB)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	4	2.2%
	40 ～ 49	640	34	5.3%
	50 ～ 59	936	151	16.1%
	60 ～ 69	617	188	30.5%
	70 ～ 79	83	52	62.7%
	80 ～	14	10	71.4%
	計	2,482	439	17.7%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	0	0.0%
	40 ～ 49	483	9	1.9%
	50 ～ 59	570	13	2.3%
	60 ～ 69	254	25	9.8%
	70 ～ 79	46	11	23.9%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,474	59	4.0%
合計		3,956	498	12.6%





⑩胸部X線

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	3	1.6%
	40 ～ 49	625	18	2.9%
	50 ～ 59	861	29	3.4%
	60 ～ 69	597	35	5.9%
	70 ～ 79	82	10	12.2%
	80 ～	13	0	0.0%
	計	2,370	95	4.0%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	116	1	0.9%
	40 ～ 49	474	11	2.3%
	50 ～ 59	544	23	4.2%
	60 ～ 69	244	16	6.6%
	70 ～ 79	47	1	2.1%
	80 ～	4	3	75.0%
	計	1,429	55	3.8%
合計		3,799	150	3.9%





⑪喀痰

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	0		
	30 ～ 39	1	0	0.0%
	40 ～ 49	19	0	0.0%
	50 ～ 59	63	0	0.0%
	60 ～ 69	55	0	0.0%
	70 ～ 79	13	0	0.0%
	80 ～	3	0	0.0%
	計	154	0	0.0%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	0		
	40 ～ 49	5	0	0.0%
	50 ～ 59	5	0	0.0%
	60 ～ 69	4	0	0.0%
	70 ～ 79	2	0	0.0%
	80 ～	1	0	0.0%
	計	17	0	0.0%
合計		171	0	0.0%





⑫心電図

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	3	42.9%
	30 ～ 39	185	47	25.4%
	40 ～ 49	640	182	28.4%
	50 ～ 59	938	298	31.8%
	60 ～ 69	626	265	42.3%
	70 ～ 79	87	57	65.5%
	80 ～	14	13	92.9%
	計	2,497	865	34.6%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	30	25.6%
	40 ～ 49	484	70	14.5%
	50 ～ 59	571	130	22.8%
	60 ～ 69	256	69	27.0%
	70 ～ 79	47	20	42.6%
	80 ～	4	2	50.0%
	計	1,479	321	21.7%
合計		3,976	1,186	29.8%





⑬眼底

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	1	14.3%
	30 ～ 39	185	21	11.4%
	40 ～ 49	642	112	17.4%
	50 ～ 59	941	194	20.6%
	60 ～ 69	622	157	25.2%
	70 ～ 79	84	36	42.9%
	80 ～	13	8	61.5%
	計	2,494	529	21.2%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	4	3.4%
	40 ～ 49	484	63	13.0%
	50 ～ 59	569	91	16.0%
	60 ～ 69	255	55	21.6%
	70 ～ 79	47	15	31.9%
	80 ～	3	1	33.3%
	計	1,475	229	15.5%
合計		3,969	758	19.1%





⑭眼圧

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	3	1.6%
	40 ～ 49	642	10	1.6%
	50 ～ 59	940	14	1.5%
	60 ～ 69	623	9	1.4%
	70 ～ 79	83	0	0.0%
	80 ～	13	0	0.0%
	計	2,493	36	1.4%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	1	0.9%
	40 ～ 49	484	4	0.8%
	50 ～ 59	567	1	0.2%
	60 ～ 69	255	0	0.0%
	70 ～ 79	47	0	0.0%
	80 ～	4	0	0.0%
	計	1,474	6	0.4%
合計		3,967	42	1.1%





⑮尿糖

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	3	1.6%
	40 ～ 49	642	16	2.5%
	50 ～ 59	943	45	4.8%
	60 ～ 69	628	25	4.0%
	70 ～ 79	87	2	2.3%
	80 ～	14	0	0.0%
	計	2,506	91	3.6%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	1	0.9%
	40 ～ 49	485	4	0.8%
	50 ～ 59	572	9	1.6%
	60 ～ 69	256	4	1.6%
	70 ～ 79	47	0	0.0%
	80 ～	4	0	0.0%
	計	1,481	18	1.2%
合計		3,987	109	2.7%





⑩尿蛋白

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	27	14.6%
	40 ～ 49	642	125	19.5%
	50 ～ 59	943	179	19.0%
	60 ～ 69	628	113	18.0%
	70 ～ 79	87	20	23.0%
	80 ～	14	6	42.9%
	計	2,506	470	18.8%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	15	12.8%
	40 ～ 49	485	71	14.6%
	50 ～ 59	572	65	11.4%
	60 ～ 69	256	30	11.7%
	70 ～ 79	47	8	17.0%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,481	190	12.8%
合計		3,987	660	16.6%





⑪尿潜血

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	8	4.3%
	40 ～ 49	642	31	4.8%
	50 ～ 59	943	61	6.5%
	60 ～ 69	628	34	5.4%
	70 ～ 79	87	11	12.6%
	80 ～	14	3	21.4%
	計	2,506	148	5.9%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	25	21.4%
	40 ～ 49	485	119	24.5%
	50 ～ 59	572	126	22.0%
	60 ～ 69	256	61	23.8%
	70 ～ 79	47	11	23.4%
	80 ～	4	2	50.0%
	計	1,481	344	23.2%
合計		3,987	492	12.3%





⑮肺機能

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	6	3.2%
	40 ～ 49	640	19	3.0%
	50 ～ 59	936	40	4.3%
	60 ～ 69	617	30	4.9%
	70 ～ 79	84	9	10.7%
	80 ～	14	6	42.9%
	計	2,483	110	4.4%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	4	3.4%
	40 ～ 49	480	5	1.0%
	50 ～ 59	571	5	0.9%
	60 ～ 69	253	7	2.8%
	70 ～ 79	47	2	4.3%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,472	24	1.6%
合計		3,955	134	3.4%





⑯腎機能 (BUN,Cr,eGFR)

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	3	42.9%
	30 ～ 39	185	38	20.5%
	40 ～ 49	642	128	19.9%
	50 ～ 59	943	197	20.9%
	60 ～ 69	629	155	24.6%
	70 ～ 79	87	44	50.6%
	80 ～	14	7	50.0%
	計	2,507	572	22.8%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	30	25.6%
	40 ～ 49	485	156	32.2%
	50 ～ 59	572	207	36.2%
	60 ～ 69	256	87	34.0%
	70 ～ 79	47	17	36.2%
	80 ～	4	1	25.0%
	計	1,481	498	33.6%
合計		3,988	1,070	26.8%



②⑩炎症反応（CRP）

	年代	受診者	有所見者	有所見率
男性	～ 29	7	0	0.0%
	30 ～ 39	185	16	8.6%
	40 ～ 49	642	40	6.2%
	50 ～ 59	943	53	5.6%
	60 ～ 69	629	44	7.0%
	70 ～ 79	87	6	6.9%
	80 ～	14	1	7.1%
	計	2,507	160	6.4%
女性	～ 29	0		
	30 ～ 39	117	10	8.5%
	40 ～ 49	485	25	5.2%
	50 ～ 59	572	23	4.0%
	60 ～ 69	256	13	5.1%
	70 ～ 79	47	1	2.1%
	80 ～	4		0.0%
	計	1,481	72	4.9%
合計		3,988	232	5.8%



IV 項目別精検結果


IV-1. 糖尿病健診

精検受診率は HbA1c 群が59.5% に対し、尿糖では32.7%と例年同様に低い傾向にあった。

①受診者数と要精検率・精検受診率年次推移


FPG群

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	62,078	62,772	63,598	63,191	63,338
要精検者数	1,791	1,904	2,177	2,296	2,166
要精検率	2.9%	3.0%	3.4%	3.6%	3.4%
精検受診者数	743	825	966	1,028	933
精検受診率	41.5%	43.3%	44.4%	44.8%	43.1%




HbA1c 群

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	32,754	33,388	33,813	33,114	32,329
要精検者数	1,156	1,487	1,415	1,247	1,180
要精検率	3.5%	4.5%	4.2%	3.8%	3.6%
精検受診者数	649	886	827	697	702
精検受診率	56.1%	59.6%	58.4%	55.9%	59.5%



尿糖群

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	67,438	68,068	68,469	68,440	68,525
要精検者数	820	745	654	634	572
要精検率	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%	0.8%
精検受診者数	235	218	196	188	187
精検受診率	28.7%	29.3%	30.0%	29.7%	32.7%



②精検結果

FPG群 126mg/dL 以上群

	正常		境界型		糖尿病型		計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
精検受診者数	166	83	69	35	394	180	629	298
計	249 26.9%		104 11.2%		574 61.9%		927	

HbA1c 6.5% 以上群

	正常		境界型		糖尿病型		計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
精検受診者数	56	58	41	29	274	240	371	327
計	114 16.3%		70 10.0%		514 73.6%		698	

尿糖群

	正常		境界型		糖尿病型		計	
	男	女	男	女	男	女	男	女
精検受診者数	51	11	7	1	82	19	140	31
計	62 36.3%		8 4.7%		101 59.1%		171	

Ⅳ－２．眼科検診

眼底、眼圧の要精検率はそれぞれ13.5 %、1.3 %であった。


眼底検査の判定区分は平成26年度まで 『異常なし』『要精検』のみであったが、平成27年度より『異常なし』『軽度異常あるも心配なし』『要経過観察』『要精検』『要治療継続』の5区分に変更となった。

精検受診率は眼底が61.1 %、眼圧が55.3 %でほぼ例年どおりの受診率だった。

①受診者数と要精検率・精検受診率年次推移


眼底検査

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	21,424	21,718	22,173	22,359	22,106
要精検者数	5,075	4,748	2,697	2,912	2,995
要精検率	23.7%	21.9%	12.2%	13.0%	13.5%
精検受診者数	3,008	2,808	1,516	1,741	1,830
精検受診率	59.3%	59.1%	56.2%	59.8%	61.1%



眼圧検査

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	19,208	19,611	20,131	20,378	19,920
要精検者数	356	393	505	429	262
要精検率	1.9%	2.0%	2.5%	2.1%	1.3%
精検受診者数	211	220	269	245	145
精検受診率	59.3%	56.0%	53.3%	57.1%	55.3%



②精検結果

眼底検査

異常なし		504
緑内障関連	緑内障	283
	高眼圧症	6
	視神経乳頭陥凹	369
	視神経乳頭出血	4
	網膜神経線維層萎縮	7
視神経萎縮		9
血管性疾患	網膜静脈分枝閉塞症	52
	網膜中心静脈閉塞症	5
	網膜中心動脈閉塞症	2
	網膜動脈硬化症	12
	高血圧性網膜症	3
	眼底出血	57
糖尿病性網膜症		77
黄斑変性症		68
黄斑前膜		108
黄斑円孔		7
黄斑出血		2
中心性漿液性網脈絡膜症		1
網膜裂孔・網膜剥離		10
網膜色素変性症		4
ぶどう膜炎		1
網脈絡膜萎縮		16
白内障		237
屈折異常		20
その他の眼障害		77
計		1,941

眼圧検査


異常なし	46
緑内障	25
高眼圧症	66
視神経乳頭陥凹	10
糖尿病網膜症	1
白内障	2
その他の眼障害	1
計	151

Ⅳ－３．循環器系・腎機能・肝機能検診

精検受診率は例年と比較しほぼ変化がなく、心電図と腎機能以外は50%以下であった。

①受診者数と要精検率・精検受診率

項目	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率
血圧	70,809	1,926	2.7%	576	29.9%
心電図	61,529	2,544	4.1%	1,377	54.1%
腎機能	68,228	6,768	9.9%	3,473	51.3%
尿酸	43,707	375	0.9%	103	27.5%
脂質	64,706	3,965	6.1%	1,191	30.0%
肝機能	64,690	8,810	13.6%	3,676	41.7%




Ⅳ－４．全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

受診者は男女ともに40～49歳が最も多く、それぞれ4,318名と2,637名であった。



①受診者数と要精検率・精検受診率年次推移

年度	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	18,175	18,392	19,131	19,605	20,524
有所見者数	17,803	17,997	18,809	19,317	20,243
有所見率	98.0%	97.9%	98.3%	98.5%	98.6%
要精検者数	12,401	12,449	12,731	10,961	11,551
要精検率	68.2%	67.7%	66.5%	55.9%	56.3%
精検受診者数	4,298	4,242	4,493	4,068	4,366
精検受診率	34.7%	34.1%	35.3%	37.1%	37.8%





②年代別有所見者数と要精検者数

性別	年代	受診者数	有所見者数	有所見率	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率
男性	～ 39	1,819	1,795	98.7%	924	50.8%	237	25.6%
	40 ～ 49	4,318	4,277	99.1%	2,511	58.2%	701	27.9%
	50 ～ 59	3,797	3,781	99.6%	2,436	64.2%	904	37.1%
	60 ～ 69	2,821	2,808	99.5%	1,977	70.1%	886	44.8%
	70 ～	329	328	99.7%	242	73.6%	123	50.8%
	計	13,084	12,989	99.3%	8,090	61.8%	2,851	35.2%
女性	～ 39	906	853	94.2%	354	39.1%	118	33.3%
	40 ～ 49	2,637	2,545	96.5%	1,145	43.4%	430	37.6%
	50 ～ 59	2,536	2,508	98.9%	1,231	48.5%	587	47.7%
	60 ～ 69	1,245	1,232	99.0%	660	53.0%	340	51.5%
	70 ～	116	116	100.0%	71	61.2%	40	56.3%
	計	7,440	7,254	97.5%	3,461	46.5%	1,515	43.8%
合計		20,524	20,243	98.6%	11,551	56.3%	4,366	37.8%



③項目別有所見者数と要精検者数

性別	検査項目	受診者数	有所見者数	有所見率	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率
男性	身体計測	13,084	4,536	34.7%	—	—	—	—
	視力	13,078	528	4.0%	528	4.0%	70	13.3%
	聴力簡易	13,059	3,288	25.2%	1,743	13.3%	184	10.6%
	血圧	13,084	4,278	32.7%	602	4.6%	144	23.9%
	尿一般・腎	13,084	4,905	37.5%	1,348	10.3%	502	37.2%
	代謝	13,084	2,678	20.5%	220	1.7%	51	23.2%
	糖代謝	13,084	6,203	47.4%	733	5.6%	260	35.5%
	脂質	13,084	8,163	62.4%	1,254	9.6%	295	23.5%
	肝機能	13,084	8,768	67.0%	3,135	24.0%	1,092	34.8%
	血液学	13,084	3,954	30.2%	1,486	11.4%	423	28.5%
	肺機能	324	15	4.6%	13	4.0%	6	46.2%
	眼底	659	90	13.7%	71	10.8%	31	43.7%
	心電図	13,076	6,138	46.9%	591	4.5%	240	40.6%
	胸部検診	13,065	890	6.8%	184	1.4%	138	75.0%
	胃部X線	12,380	1,571	12.7%	633	5.1%	303	47.9%
	超音波	325	255	78.5%	20	6.2%	10	50.0%
	便潜血	12,854	1,051	8.2%	1,051	8.2%	502	47.8%
	肝炎B型	179	3	1.7%	3	1.7%	2	66.7%
	肝炎C型	179	0	0.0%	0	0.0%	—	—
女性	身体計測	7,440	1,769	23.8%	—	—	—	—
	視力	7,436	328	4.4%	328	4.4%	68	20.7%
	聴力簡易	7,420	471	6.3%	350	4.7%	64	18.3%
	血圧	7,440	1,633	21.9%	158	2.1%	54	34.2%
	尿一般・腎	7,440	3,850	51.7%	916	12.3%	411	44.9%
	代謝	7,440	183	2.5%	6	0.1%	0	0.0%
	糖代謝	7,440	2,096	28.2%	137	1.8%	50	36.5%
	脂質	7,440	4,134	55.6%	668	9.0%	241	36.1%
	肝機能	7,440	2,875	38.6%	519	7.0%	254	48.9%
	血液学	7,440	2,777	37.3%	790	10.6%	292	37.0%
	肺機能	201	0	0.0%	0	0.0%	—	—
	眼底	231	27	11.7%	22	9.5%	10	45.5%
	心電図	7,437	2,742	36.9%	215	2.9%	98	45.6%
	胸部検診	7,412	300	4.0%	51	0.7%	41	80.4%
	胃部X線	6,723	897	13.3%	170	2.5%	118	69.4%
	超音波	200	142	71.0%	29	14.5%	19	65.5%
	便潜血	7,055	358	5.1%	358	5.1%	214	59.8%
	子宮頸がん	644	20	3.1%	20	3.1%	14	70.0%
	乳がん	615	43	7.0%	43	7.0%	34	79.1%
	肝炎B型	52	0	0.0%	0	0.0%	—	—
	肝炎C型	52	0	0.0%	0	0.0%	—	—



④精検結果（上位20）

精検受診者；4,068名


	疾患名	男性	女性	計
	異常なし	1,392	778	2,170
1	脂肪肝	362	83	445
2	脂質異常症	241	186	427
3	肝機能障害	246	73	319
4	大腸ポリープ	238	71	309
5	腎炎および腎障害	201	70	271
6	アルコール性肝障害	234	10	244
7	糖尿病	199	37	236
8	難聴	163	55	218
9	貧血	29	153	182
10	高血圧	130	48	178
11	胃炎	129	48	177
12	血尿	22	76	98
13	不整脈	68	26	94
14	心筋障害	64	23	87
15	赤血球増加症	76	7	83
16	慢性肝炎	67	15	82
17	白血球増加症	59	17	76
18	高尿酸血症	49	0	49
19	蛋白尿	37	6	43
20	胃ポリープ	18	15	33

IV－５．聴力検診

聴力検査を実施した人数は65,733名で、要精検率は12.0％、精密検査受診率は20.6％で、
わずかなが受診者数は増加傾向にある。

①受診者数と要精検率・精検受診率年次推移

年度	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	63,930	64,450	65,142	65,435	65,733
要精検者数	7,826	7,551	7,848	7,931	7,919
要精検率	12.2%	11.7%	12.0%	12.1%	12.0%
精検受診者数	1,419	1,379	1,418	1,592	1,628
精検受診率	18.1%	18.3%	18.1%	20.1%	20.6%



②精検結果 (重複所見あり)

異常なし	199
感音性難聴	1,255
騒音性難聴	13
伝音性難聴	3
混合性難聴	131
耳管狭窄症	26
中耳炎	60
めまい症候群	5
耳鳴	14
突発性難聴	12
その他	14


Ⅳ－６．骨検診

受診者数は60歳代、70歳代、50歳代の順に多かった。

要精検率は年代が上がると共に高くなる傾向にある。


①受診者数と要精検率・精検受診率年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
受診者数	2,010	2,098	2,020	1,913	1,934
要精検者数	204	246	239	217	405
要精検率	10.1%	11.7%	11.8%	11.3%	20.9%
精検受診者数	108	135	119	109	228
精検受診率	52.9%	54.9%	49.8%	50.2%	56.3%



②年代別要精検率と精検受診率

年代	29歳以下	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	計
受診者数	1	104	170	386	657	616	1,934
要精検者数	0	2	1	40	150	212	405
要精検率	0.0%	1.9%	0.6%	10.4%	22.8%	34.4%	20.9%
精検受診者数	—	0	1	27	84	116	228
精検受診率	—	0.0%	100.0%	67.5%	56.0%	54.7%	56.3%



③年代別精検結果

	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	計
異常なし	—	1	10	21	23	55
骨塩減少症	—	0	2	7	12	21
骨粗鬆症	—	0	14	56	77	147
その他	—	0	1	0	4	5
計	—	1	27	84	116	228

	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	計
骨萎縮度Ⅰ度	—	0	1	3	2	6
骨萎縮度Ⅱ度	—	1	6	16	25	48
骨萎縮度Ⅲ度	—	0	4	17	24	45
骨萎縮度Ⅳ度	—	0	2	5	6	13
骨萎縮度不明	—	0	14	43	59	116
計	—	1	27	84	116	228

Ⅳ－７．肝炎ウイルス検診

肝炎ウイルス検診受診者数は752名だった。

B型の要精検者11名中6名が要経過観察となった。

①年代別要精検率と精検受診率

C型

	年代	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率
男性	～ 39	50				
	40 ～ 49	101				
	50 ～ 59	72				
	60 ～ 69	157				
	70 ～	77	1	1.3%	0	0.0%
	計	457	1	0.2%	0	0.0%
女性	～ 39	14				
	40 ～ 49	81	1	1.2%	1	100.0%
	50 ～ 59	63				
	60 ～ 69	98				
	70 ～	39				
	計	295	1	0.3%	1	100.0%
合計		752	2	0.3%	1	50.0%

要精検：HCV 抗体50.0以上・HCV 抗体1.0～49.9でHCV-RNA(+)

B型

	年代	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率
男性	～ 39	50	1	2.0%	0	0.0%
	40 ～ 49	101	1	1.0%	1	100.0%
	50 ～ 59	72	1	1.4%	1	100.0%
	60 ～ 69	157	3	1.9%	2	66.7%
	70 ～	77	2	2.6%	1	50.0%
	計	457	8	1.8%	5	62.5%
女性	～ 39	14				
	40 ～ 49	81	1	1.2%	1	100.0%
	50 ～ 59	63				
	60 ～ 69	98	2	2.0%	1	50.0%
	70 ～	39				
	計	295	3	1.0%	2	66.7%
合計		752	11	1.5%	7	63.6%

②精検結果

経過観察	C型	0
	B型	6
その他	C型	1
	B型	1

V がん検診など

V-1. 胃がん検診


受診者は41,878名で前年度と比較し134名減少した。

要精検率は4.3%と昨年度より減少し、精検受診率は69.7%とほぼ例年どおりだった。

精検により胃がんと診断されたものは31例だった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	21,177	21,220	21,544	21,739	22,354
八戸住民	15,553	16,068	16,241	15,402	14,776
階上住民	949	990	1,026	1,029	1,011
人間ドック	4,045	3,880	3,886	3,842	3,737
計	41,724	42,158	42,697	42,012	41,878




②有所見者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
経過観察	3,084	3,422	3,723	3,927	3,863
要精検	2,053	1,836	2,212	2,118	1,814
要精検率	4.9%	4.4%	5.2%	5.0%	4.3%
精検受診者数	1,426	1,237	1,539	1,468	1,264
精検受診率	69.5%	67.4%	69.6%	69.3%	69.7%



③年代別有所見者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	122	3,650	9,871	9,942	10,488	7,805	41,878
経過観察	6	190	816	977	1,045	829	3,863
要精検	1	81	319	460	556	397	1,814
要精検率	0.8%	2.2%	3.2%	4.6%	5.3%	5.1%	4.3%
精検受診者数	1	36	190	272	416	349	1,264
精検受診率	100.0%	44.4%	59.6%	59.1%	74.8%	87.9%	69.7%



④精検結果

	職域・その他			八戸住民			階上住民			人間ドック			計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	86	34	120	82	63	145	6	3	9	31	14	45	205	114	319
食道がん		1	1	4		4	1		1				5	1	6
胃がん	10	3	13	13	5	18							23	8	31
胃潰瘍	17	3	20	13	9	22	3		3	8	1	9	41	13	54
胃潰瘍瘢痕	37	4	41	18	16	34	4	3	7	5		5	64	23	87
十二指腸潰瘍	10	1	11	1		1					1	1	11	2	13
十二指腸潰瘍瘢痕	3	1	4	5		5				3		3	11	1	12
胃粘膜下腫瘍	6	6	12	9	9	18	1		1	2	4	6	18	19	37
胃炎	145	58	203	150	85	235	7	5	12	47	9	56	349	157	506
胃ポリープ	21	21	42	36	35	71		4	4	7	8	15	64	68	132
その他	18	7	25	25	10	35	2	1	3	3	1	4	48	19	67

V-2. 大腸がん検診


受診者数は46,690名であった。

要精検率は8.1%、精検受診率は67.3%と、例年よりも高い傾向にあった。

精検により大腸がんと診断されたものは72例であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	21,676	21,757	22,510	23,221	24,307
八戸住民	18,314	19,018	19,221	18,036	17,347
階上住民	1,100	1,112	1,183	1,188	1,156
人間ドック	4,088	3,911	3,977	3,909	3,880
計	45,178	45,798	46,891	46,354	46,690




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	3,376	3,415	3,388	3,347	3,785
要精検率	7.5%	7.5%	7.2%	7.2%	8.1%
精検受診者数	2,168	2,243	2,208	2,198	2,547
精検受診率	64.2%	65.7%	65.2%	65.7%	67.3%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	186	3,907	10,584	10,814	11,869	9,330	46,690
要精検	16	242	627	723	1,053	1,124	3,785
要精検率	8.6%	6.2%	5.9%	6.7%	8.9%	12.0%	8.1%
精検受診者数	8	132	330	393	752	931	2,547
精検受診率	50.0%	54.5%	52.6%	54.4%	71.4%	82.8%	67.3%



④精検結果

	職域・その他			八戸住民			階上住民			人間ドック			計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	284	163	447	213	318	531	11	14	25	44	32	76	552	527	1,079
大腸癌	14	4	18	19	23	42	1	2	3	5	4	9	39	33	72
大腸炎	5	2	7	3	2	5				3		3	11	4	15
大腸ポリープ	291	86	377	436	286	722	34	19	53	67	19	86	828	410	1,238
大腸憩室	12	3	15	12	16	28		1	1	8	1	9	32	21	53
痔核	7	12	19	7	16	23				1	2	3	15	30	45
その他	16	3	19	12	10	22	1		1	2	1	3	31	14	45

V-3. 胸部検診（胸部X線、喀痰、ヘリカルCT）


受診者数は68,325名であった。

要精検率は1.8%、精検受診率は86.5%とほぼ例年どおりだった。

精検により肺がんと診断されたものは33例であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	42,798	42,846	43,588	44,365	45,230
八戸住民	18,697	19,210	19,367	18,687	17,933
階上住民	1,112	1,130	1,175	1,209	1,191
人間ドック	4,230	4,063	4,097	4,011	3,971
計	66,837	67,249	68,227	68,272	68,325




②有所見者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
経過観察	3,914	4,182	4,240	4,193	4,159
要精検	1,178	1,218	1,388	1,158	1,244
要精検率	1.8%	1.8%	2.0%	1.7%	1.8%
精検受診者数	969	1,049	1,182	974	1,076
精検受診率	82.3%	86.1%	85.2%	84.1%	86.5%



③年代別有所見者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	7,940	9,098	13,549	13,244	13,997	10,497	68,325
経過観察	27	106	378	721	1,341	1,586	4,159
要精検	24	58	138	214	359	451	1,244
要精検率	0.3%	0.6%	1.0%	1.6%	2.6%	4.3%	1.8%
精検受診者数	20	38	107	175	309	427	1,076
精検受診率	83.3%	65.5%	77.5%	81.8%	86.1%	94.7%	86.5%



④精検結果

	職域・その他			八戸住民			階上住民			人間ドック			計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	297	176	473	240	216	456	9	13	22	15	12	27	561	417	978
肺結核	1	2	3							1		1	2	2	4
非結核性抗酸菌症	1	2	3		1	1					1	1	1	4	5
サルコイドーシス		3	3											3	3
肺がん(原発・進行がん)	11	6	17	4	1	5	1		1				16	7	23
肺がん(原発・0～I期のがん)	2	2	4	2	1	3		1	1	2		2	6	4	10
肺がんの疑い又は未確定	3		3	1		1							4		4
転移性肺腫瘍	3		3	1		1							4		4
胸腺の悪性新生物											1	1		1	1
肉芽腫		1	1											1	1
甲状腺腫	1		1		1	1							1	1	2
腺腫様甲状腺腫		1	1											1	1
びまん性甲状腺腫	1		1										1		1
甲状腺結節性		1	1								1	1		2	2
胸部大動脈瘤	2		2										2		2
心不全	1		1										1		1
心疾患その他				1	2	3							1	2	3
循環系その他	1		1	1		1							2		2
間質性肺炎	3	1	4	3		3		1	1				6	2	8
肺炎		3	3	1		1							1	3	4
ニューモシスチス肺炎	1		1										1		1
喘息				1		1				1		1	2		2
気管支拡張症	2		2	1		1		1	1				3	1	4
慢性閉塞性肺疾患	2		2		1	1							2	1	3

肺のう胞	1		1										1		1
肺分画症		1	1											1	1
肺真菌症	1		1										1		1
脂肪腫	1		1										1		1
胸腺腫										1		1	1		1
肺インフルエンザ菌感染症					1	1								1	1
胸部その他	1		1	1		1							2		2
食道アカラシア	1		1										1		1
脾臓癌		1	1											1	1
前立腺癌				1		1							1		1
悪性リンパ腫				1		1							1		1
糖尿病				1		1							1		1
胆石	1		1										1		1

V-4. 子宮頸がん検診

標本作成はLBC（液状検体細胞診）法である。


受診者数は13,078名でほぼ例年どおりであった。（平成26年度は無料クーポン券の再配布により増加した）

要精検率は3.0%、精検受診率は84.4%だった。

精検により診断された子宮がんは、上皮内癌1例、子宮体癌2例であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	1,581	1,568	1,568	1,753	1,492
八戸住民	4,138	4,141	3,941	4,175	4,035
階上住民	414	399	393	465	409
人間ドック	518	468	476	440	422
受託医療機関	6,454	9,091	7,346	6,302	6,720
計	13,105	15,667	13,724	13,135	13,078




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	315	488	410	306	391
要精検率	2.4%	3.1%	3.0%	2.3%	3.0%
精検受診者数	278	423	365	259	330
精検受診率	88.3%	86.7%	89.0%	84.6%	84.4%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	1,074	1,908	3,022	2,841	2,559	1,674	13,078
要精検	86	92	97	72	29	15	391
要精検率	8.0%	4.8%	3.2%	2.5%	1.1%	0.9%	3.0%
精検受診者数	70	79	80	63	27	11	330
精検受診率	81.4%	85.9%	82.5%	87.5%	93.1%	73.3%	84.4%



④精検結果

	職域・その他	八戸住民	階上住民	人間ドック	受託医療機関	計
異常なし	4	10			29	43
子宮頸癌未確定	5	24	2	3	84	118
子宮体癌					2	2
上皮内癌					1	1
軽度異形成	18	24		4	92	138
中等度異形成	2	4			11	17
高度異形成	2	3			6	11

V-5. 婦人科超音波検査（施設内）

子宮頸がん検診の際、オプションとして行っている経膣超音波検査である。


受診者数は5,391名であった。

要精検率は6.5%、精検受診率は84.5%だった。

精検により卵巣がんと診断されたものは3例だった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
施設	5,686	5,762	5,532	5,954	5,391




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	375	405	379	329	349
要精検率	6.6%	7.0%	6.9%	5.5%	6.5%
精検受診者数	338	340	332	271	295
精検受診率	90.1%	84.0%	87.6%	82.4%	84.5%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	207	500	1,009	1,128	1,513	1,034	5,391
要精検	13	38	108	80	62	48	349
要精検率	6.3%	7.6%	10.7%	7.1%	4.1%	4.6%	6.5%
精検受診者数	11	32	86	64	56	46	295
精検受診率	84.6%	84.2%	79.6%	80.0%	90.3%	95.8%	84.5%



④精検結果

	施設
異常なし	73
卵巣癌	2
卵巣境界悪性腫瘍	1
後腹膜腫瘍	1
子宮筋腫	83
卵巣良性腫瘍	2
卵巣のう腫（のう胞性）	33
卵巣のう腫（チョコレート）	4
子宮内膜症性卵巣のう腫	4
卵巣のう腫（皮様性）	6
卵巣腫瘍	16
鉄欠乏性貧血	3
子宮内膜症	2
子宮腺筋症	6
子宮内膜肥厚	35
子宮内石灰化	1
ダグラス窩腹水	2
子宮体部ポリープ	21
子宮留水症	25
子宮頸管のう胞	2
胞状奇胎	1

V-6. 乳がん検診


平成29年度より視触診が廃止となった。受診者数は10,870名であった。

要精検率は5.3%に減少し、精検受診率は93.9%であった。

精検により乳がんと診断されたものは51例であり、がん発見率は0.47%であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	1,592	1,508	2,742	3,324	4,567
八戸住民	8,316	9,254	6,329	6,277	5,160
階上住民	624	597	480	503	423
人間ドック	659	584	695	697	720
計	11,191	11,943	10,246	10,801	10,870




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	646	879	785	717	571
要精検率	5.8%	7.4%	7.7%	6.6%	5.3%
精検受診者数	606	812	734	690	536
精検受診率	93.8%	92.4%	93.5%	96.2%	93.9%
がん発見者数	27	36	49	49	51
がん発見率	0.24%	0.30%	0.48%	0.45%	0.47%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	125	889	2,797	2,544	2,716	1,799	10,870
要精検	5	22	243	124	119	58	571
要精検率	4.0%	2.5%	8.7%	4.9%	4.4%	3.2%	5.3%
精検受診者数	5	22	222	113	117	57	536
精検受診率	100.0%	100.0%	91.4%	91.1%	98.3%	98.3%	93.9%




④精検結果

	職域・その他	八戸住民	階上住民	人間ドック	計
異常なし	141	155	10	18	324
乳房の良性新生物	19	24			43
乳房のう胞（孤立性）	7	28	4	3	42
びまん（広汎）性のう胞	4	7	2	1	14
乳頭分泌物		1			1
その他の性状不詳の新生物	3	4			7
乳がん（早期・非浸潤）	3	2		1	6
乳がん（早期）	10	15	2	1	28
乳がん（進行）	8	6		2	16
乳がんの疑い・未確定	1				1
その他	27	27	1	6	61

乳房X線検査


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	1,203	1,123	2,343	2,886	3,873
八戸住民	5,145	6,140	5,902	5,736	4,845
階上住民	401	320	480	503	423
人間ドック	474	423	638	649	669
計	7,223	8,006	9,363	9,774	9,810




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	473	716	619	555	522
要精検率	6.5%	8.9%	6.6%	5.7%	5.3%
精検受診者数	446	669	586	536	487
精検受診率	94.3%	93.4%	94.7%	96.6%	93.3%
がん発見者数	25	36	46	48	50
がん発見率	0.35%	0.45%	0.49%	0.49%	0.51%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	1	27	2,752	2,525	2,709	1,796	9,810
要精検	0	3	225	119	117	58	522
要精検率	0.0%	11.1%	8.2%	4.7%	4.3%	3.2%	5.3%
精検受診者数		3	204	108	115	57	487
精検受診率		100.0%	90.7%	90.8%	98.3%	98.3%	93.3%




④精検結果

	職域・その他	八戸住民	階上住民	人間ドック	計
異常なし	131	149	10	18	308
乳房の良性新生物	11	19			30
乳房のう胞（孤立性）	5	27	4	3	39
びまん（広汎）性のう胞	3	6	2	1	12
その他の性状不詳の新生物	3	4			7
乳がん（早期・非浸潤）	3	2		1	6
乳がん（早期）	10	14	2	1	27
乳がん（進行）	8	6		2	16
乳がんの疑い・未確定	1				1
その他	18	21	1	5	45

乳腺超音波検査


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	408	368	463	1,017	1,482
八戸住民	385	373	430	571	323
人間ドック	50	33	59	116	169
計	843	774	952	1,704	1,974




②要精検者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
要精検	64	48	87	78	58
要精検率	7.6%	6.2%	9.1%	4.6%	2.9%
精検受診者数	62	45	78	76	56
精検受診率	96.9%	93.8%	89.7%	97.4%	96.6%
がん発見者数	3	0	5	9	3
がん発見率	0.36%	0.00%	0.53%	0.53%	0.15%



③年代別要精検者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	125	889	531	243	137	49	1,974
要精検	5	19	24	6	4	0	58
要精検率	4.0%	2.1%	4.5%	2.5%	2.9%	0.0%	2.9%
精検受診者数	5	19	22	6	4		56
精検受診率	100.0%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%		96.6%



④精検結果

	職域・その他	八戸住民	人間ドック	計
異常なし	17		1	18
乳房の良性新生物	13	2		15
乳房のう胞（孤立性）	3			3
びまん（広汎）性のう胞	2			2
乳がん（早期）		1		1
乳がん（進行）	1			1
乳がんの疑い・未確定	1			1
その他	11	4	1	16

V-7. 前立腺がん検診


受診者数は8,039名であった。

精検受診率は81.8%であった。

精検により前立腺がんと診断されたものは74例であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	949	984	1,045	1,074	1,132
八戸住民	6,151	6,408	6,657	6,464	6,329
人間ドック	635	633	652	623	578
計	7,735	8,025	8,354	8,161	8,039




②有所見者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
経過観察	395	462	489	446	466
要精検	416	438	498	432	418
要精検率	5.4%	5.5%	6.0%	5.3%	5.2%
精検受診者数	262	277	385	334	342
精検受診率	63.0%	63.2%	77.3%	77.3%	81.8%



③年代別有所見者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数		6	74	1,524	2,896	3,539	8,039
経過観察				33	153	280	466
要精検				36	122	260	418
要精検率		0.0%	0.0%	2.4%	4.2%	7.3%	5.2%
精検受診者数				28	90	224	342
精検受診率				77.8%	73.8%	86.2%	81.8%



④精検結果

	職域・その他	八戸住民	人間ドック	計
異常なし	17	108	4	129
前立腺がん	7	65	2	74
前立腺肥大症	6	110	4	120
前立腺炎		6	1	7
その他の前立腺疾患		3		3

V-8. 腹部超音波検診


受診者数は19,969名であった。

要精検率は5.4%、精検受診率は72.5%とほぼ例年どおりであった。

精検により悪性腫瘍と診断されたものは28例であった。


①受診者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
職域・その他	3,478	3,701	4,165	3,665	3,911
八戸住民	9,404	10,025	10,237	11,484	11,214
階上住民	710	759	809	874	862
人間ドック	4,238	4,077	4,112	4,019	3,982
計	17,830	18,562	19,323	20,042	19,969




②有所見者数年次推移

	H25	H26	H27	H28	H29
経過観察	13,555	14,389	15,160	16,040	16,172
要精検	1,253	1,195	1,257	1,192	1,072
要精検率	7.0%	6.4%	6.5%	5.9%	5.4%
精検受診者数	863	836	890	862	777
精検受診率	68.9%	70.0%	70.8%	72.3%	72.5%



③年代別有所見者数

	～ 29	30 ～ 39	40 ～ 49	50 ～ 59	60 ～ 69	70 ～	計
受診者数	45	793	2,953	3,697	6,296	6,185	19,969
経過観察	16	427	2,119	2,992	5,270	5,348	16,172
要精検		32	159	164	352	365	1,072
要精検率	0.0%	4.0%	5.4%	4.4%	5.6%	5.9%	5.4%
精検受診者数		18	93	107	265	294	777
精検受診率		56.3%	58.5%	65.2%	75.3%	80.5%	72.5%



④発見悪性腫瘍の年次推移

年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
肝 臓	7 (2)	6 (2)	1	6 (3)	3 (1)	6 (1)	4 (1)	7 (5)	6 (2)	4 (3)
胆 道	2	2		2		2	4			
膵 臓	1	1	2	3		1	2	1	3	6
脾 臓										
腎 臓	5	12	9	11	4	8	11	10	8	5
膀 胱	1	10	4	9	7	12	6	12	18	12
前 立 腺	1			1						
卵 巢			1	1		1	1		1	
そ の 他	1	5 (1)	4	2	1	3	1	1	1 (1)	1
計	18	36	21	35	15	33	29	31	37	28

() : 転移性悪性腫瘍

⑤精検結果

	職域・その他			八戸住民			階上住民			人間ドック			計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
異常なし	4	7	11	32	49	81	3	3	6	14	7	21	53	66	119
胆石	16	18	34	57	49	106	3	3	6	16	6	22	92	76	168
胆嚢ポリープ	2	4	6	14	8	22		1	1	1	4	5	17	17	34
アデノミオマトーシス	3	4	7	15	10	25	1		1	3	1	4	22	15	37
胆嚢炎	1	1	2	4	1	5				2		2	7	2	9
胆管拡張	1		1	2	3	5				1		1	4	3	7
胆管がん(腫瘍)										1		1	1		1
胆嚢その他	2	1	3	6	11	17				1		1	9	12	21
肝血管腫	14	12	26	26	29	55	3	1	4	11	9	20	54	51	105
脂肪肝	3	1	4	4	4	8	2		2	3		3	12	5	17
肝嚢胞		1	1	6	3	9	2		2		1	1	8	5	13
肝硬変				3	1	4		1	1				3	2	5
肝炎				2	1	3							2	1	3
転移性肝がん				1	2	3							1	2	3
肝その他				2		2							2		2
膵嚢胞	2	3	5	23	35	58	1	3	4	2	3	5	28	44	72
膵管拡張	1		1	4	5	9	1		1	1		1	7	5	12
膵炎	1		1	1		1	1		1				3		3
膵管内乳頭粘液性腫瘍	1		1	3		3		1	1				4	1	5
膵臓結石				1	1	2							1	1	2
膵臓腫瘍(良性)					1	1								1	1
膵臓がん					5	5		1	1					6	6
膵その他				1		1							1		1
腎嚢胞	2	1	3	6	4	10	2		2	2		2	12	5	17
腎血管筋脂肪腫	1	1	2	2	5	7				1		1	4	6	10
腎結石	5	1	6	1	5	6	1		1	3		3	10	6	16
尿管結石	1		1	2	1	3				1		1	4	1	5
水腎症		2	2	1	3	4							1	5	6
腎炎				1		1							1		1
嚢胞腎				1		1				1		1	2		2
腎腫瘍					1	1								1	1
腎臓がん	1		1	4		4							5		5
腎その他	1		1	5	3	8		1	1	2		2	8	4	12
脾腫											1	1		1	1
脾のう胞										1		1	1		1
脾血管腫		1	1		2	2								3	3
副腎腫瘍				2	5	7							2	5	7
腹部大動脈瘤				6	2	8	1		1				7	2	9
膀胱結石	1		1										1		1
膀胱良性腫瘍										1		1	1		1
膀胱がん	3		3	7		7	1		1		1	1	11	1	12
膀胱その他				1	1	2				2		2	3	1	4
前立腺肥大症	2		2	6		6							8		8
子宮筋腫		9	9		3	3		1	1		4	4		17	17
子宮頸がん					1	1								1	1
卵巣嚢腫		4	4		15	15		1	1		5	5		25	25
卵巣良性腫瘍											1	1		1	1
その他	3	5	8	13	16	29	2		2	3	1	4	21	22	43

VI その他

VI－ 1. 緊急値

〈緊急報告要領〉

*心電図、胃部X線、胸部X線：読影医師の指示

*血液学、生化学、尿検査等：緊急報告値および医師の指示

血液学・生化学検査の緊急報告値

項 目	対象値
AST (U/L)	200 ≤
ALT (U/L)	200 ≤
γ-GT (U/L)	500 ≤
T-Bil (mg/dL)	5.0 ≤
Cr (mg/dL)	2.0 ≤
BUN (mg/dL)	40.0 ≤
血糖 (mg/dL)	低値 50 ≥
	高値 300 ≤
白血球 (/μL)	低値 2,000 ≥
	高値 20,000 ≤
Hb (g/dL)	6.0 ≥
血小板 (x10 ⁴ /μL)	100.0 ≤

緊急報告件数

項目	件数(件)	割合(%)	企業健診(件)	住民健診(件)
肝機能	188	62.0%	152	36
血糖	44	14.5%	35	9
血液学	33	10.9%	20	13
腎機能	22	7.3%	10	12
心電図	11	3.6%	7	4
胃部X線	3	1.0%	1	2
胸部X線	2	0.7%	1	1
合計	303	100.0%	226	77

VI- 2. 労災二次健診

①労災二次健診実施者数

	実施数			要医療			特定保健指導		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
20 代	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30 代	12	0	12	0	0	0	12	0	12
40 代	51	6	57	2	0	2	49	6	55
50 代	57	6	63	0	0	0	57	6	63
60 代	22	6	28	0	0	0	22	6	28
計	143	18	161	2	0	2	141	18	159

②心エコー検査結果

判 定	人数(人)
A 異常なし	98
B 軽度異常あるも日常生活支障なし	40
C 軽度異常あり経過観察を要する	21
D 要精密検査	2
E 現在治療中・治療継続	0

③頸動脈エコー検査結果

判定	人数(人)
A 異常なし	10
B 軽度異常あるも日常生活支障なし	29
C1 軽度異常あり経過観察を要する	114
C2 中等度異常あり経過観察を要する	8
D 要精密検査	0
E 現在治療中・治療継続	0

Ⅵ－ 3. 特定健康診断・特定保健指導

①特定健康診査（全体） 40－75歳

（人）


年度		H25			H26		
受診者数		男	女	計	男	女	計
		22,776	21,229	44,005	22,881	21,708	44,589
メタボリック シンδροーム判定	該当	4,657	1,296	5,953	4,596	1,229	5,825
	予備群	3,327	1,065	4,392	2,975	1,043	4,018
	非該当	14,791	18,868	33,659	15,310	19,436	34,746
	判定不能	1	0	1	0	0	0
階層化判定	積極的支援	2,842	383	3,225	2,634	404	3,038
	動機付け支援	1,818	1,369	3,187	1,691	1,371	3,062
	情報提供	18,116	19,477	37,593	18,556	19,933	38,489
	判定不能	0	0	0	0	0	0

H27			H28			H29		
男	女	計	男	女	計	男	女	計
23,270	22,086	45,356	22,718	21,472	44,190	22,553	21,333	43,886
4,888	1,269	6,157	4,976	1,306	6,282	5,048	1,299	6,347
2,847	935	3,782	2,697	890	3,587	2,674	915	3,589
15,535	19,882	35,417	15,044	19,276	34,320	14,831	19,118	33,949
0	0	0	1	0	1	0	1	1
2,715	474	3,189	2,719	494	3,213	2,692	522	3,214
1,617	1,353	2,970	1,585	1,369	2,954	1,631	1,421	3,052
18,938	20,259	39,197	18,413	19,609	38,022	18,230	19,389	37,619
0	0	0	1	0	0	0	1	1

②特定保健指導（全体） 40－75歳

（人）

年度		H25	H26	H27	H28	H29
動機付け支援	初回面談実施数	654	735	810	892	843
	6か月後終了者	639	708	773	865	815
	中断者	15	27	37	27	28
積極的支援	初回面談実施数	560	504	655	741	706
	6か月後終了者	268	252	343	421	392
	中断者	292	252	312	320	314



③特定健康診査（八戸市国保） 40－75歳

（人）


年度		H25			H26		
受診者数		男	女	計	男	女	計
		5,969	7,939	13,908	6,103	8,078	14,181
メタボリック シンドローム判定	該当	1,236	643	1,879	1,300	596	1,896
	予備群	885	426	1,311	718	399	1,117
	非該当	3,847	6,870	10,717	4,085	7,083	11,168
	判定不能	1	0	1	0	0	0
階層化判定	積極的支援	288	76	364	287	71	358
	動機付け支援	579	487	1,066	555	474	1,029
	情報提供	5,102	7,376	12,478	5,261	7,533	12,794
	判定不能	0	0	0	0	0	0

H27			H28			H29		
男	女	計	男	女	計	男	女	計
6,034	8,004	14,038	5,715	7,597	13,312	5,264	7,032	12,296
1,319	584	1,903	1,277	586	1,863	1,209	508	1,717
711	345	1,056	630	303	933	595	282	877
4,004	7,075	11,079	3,808	6,708	10,516	3,460	6,242	9,702
0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	83	334	260	79	339	222	56	278
545	471	1,016	517	438	955	455	404	859
5,238	7,450	12,688	4,938	7,080	12,018	4,587	6,572	11,159
0	0	0	0	0	0	0	0	0

④特定保健指導（八戸市国保） 40－75歳

（人）

年度		H25	H26	H27	H28	H29
動機付け支援	初回面談実施数	305	361	379	392	326
	6か月後終了者	305	361	379	392	326
	中断者	0	0	0	0	0
積極的支援	初回面談実施数	90	106	122	118	75
	6か月後終了者	35	51	61	63	35
	中断者	55	55	61	55	40



VI－4. 特殊健診実績

	健診者数	要精検者数	要精検率
特定化学物質	2,102	8	0.4%
じん肺	1,573	0	0%
有機溶剤	788	5	0.6%
石綿	605	0	0%
鉛	566	12	2.1%
振動	391	0	0%
V D T	341	0	0%
電離放射線	331	5	1.5%
紫・赤外線	252	27	10.7%
騒音	223	20	9.0%
総計	7,172	77	1.1%

Ⅶ 八戸市母子保健事業 (八戸市総合健診センター関連)

Ⅶ－ 1. 先天性股関節脱臼検診

八戸市の受診率は90%以上を保っている。脱臼・亜脱臼の発生率は0.06%であった。

①受診者数年次推移

(人)

区分		年度	H25	H26	H27	H28	H29
八戸市	対象人数		1,797	1,774	1,764	1,778	1,611
	健診センター		1,567	1,587	1,576	1,596	1,365
	整形外科医		102	144	148	146	174
	その他		1	0	0	0	0
	計(男:女)		1670(819:851)	1731(884:847)	1724(889:835)	1742(900:842)	1539(781:758)
	受診率(%)		92.9	97.6	97.7	97.2	95.5
八戸市以外	階上町(人)		65	68	80	71	58
	受診率(%)		74.7	81.9	100	93	89
	その他(人)		51	61	71	62	15
センター受診者数計			1,683	1,716	1,727	1,729	1,438

②健診センター受診者の要再検率と再検受診率

要再検者数と要再検率

区分 \ 年度		H25				H26				H27				H28				H29			
		八戸	階上	その他	計	八戸	階上	その他	計	八戸	階上	その他	計	八戸	階上	その他	計	八戸	階上	その他	計
要再検数	男	12	0	0	12	25	2	1	28	28	1	0	29	20	2	0	22	20	0	0	20
	女	66	2	1	69	54	1	1	56	66	4	3	73	77	2	0	79	77	0	1	78
	計	78	2	1	81	79	3	2	84	94	5	3	102	97	4	0	101	97	0	1	98
要再検率(%)		4.8				4.9				5.9				5.8				6.8			

八戸市の再検受診者数と再検受診率

	H25	H26	H27	H28	H29
再検受診者数	80	79	92	105	90
再検受診率(%)	100	100	100	100	93

③八戸市脱臼・亜脱臼発生率の年次推移

区分	年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
脱臼者人数(人)		2	7	3	3	2	3	0	3	0	0
(%)		0.11	0.24	0.17	0.16	0.11	0.17	0	0.17	0	0
脱臼+亜脱臼(人)		3	12	5	7	6	4	1	5	1	1
(%)		0.22	0.47	0.28	0.37	0.32	0.22	0.06	0.29	0.06	0.06

④RB治療例の診断別の年次推移

期間 平成20年4月1日～平成30年3月31日

年度	H20			H21			H22			H23			H24		
性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
先天性股関節脱臼		2	2	1	6	7		3	3	1	2	3		3	3
亜脱臼		1	1	1	4	5		2	2		4	4		4	4
臼蓋形成不全		3	3											3	3
その他					1	1					※1	※1			
全RB治療数		6	6	2	11	13		5	5	1	6	7		10	10

年度	H25			H26			H27			H28			H29		
性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
先天性股関節脱臼		3	3		1	1		3	3						
亜脱臼		1	1		※1	※1		2	2		1	1		2	2
臼蓋形成不全								3	3	1	14	15	1	13	14
その他	※1		※1		1	1		1	1						
全RB治療数		4	4		2	2		9	9	1	15	16	1	15	16

※H23、H25年度のその他の症例はRB治療歴なし

※H26年度の亜脱臼例はRB以外の装具を使用

Ⅶ－ 2. 児童・生徒心臓検診

要精検率と要管理率は、各々3.6%、1.9%で例年とほぼ同等であった。

新たに発見された先天性心疾患は、小学校の心房中隔欠損症1名と

中学校の僧房弁閉鎖不全症1名であった。

未精検者は小学校は3名、中学校が5名であった。

①検診結果

() : %

結果 学校	受診者数	一次結果	合同審査結果			精検結果		未精検
			精検不要		要精検	管理不要	要管理	
		合同審査 対象者	既管理	翌年再検				
小学校	1,831	75 (4.1)	42 (2.3)	3 (0.2)	30 (1.6)	10 (0.5)	17 (0.9)	3
中学校	1,993	154 (7.7)	42 (2.1)	5 (0.3)	107 (5.4)	47 (2.4)	55 (2.8)	5
総計	3,824	229 (6.0)	84 (2.2)	8 (0.2)	137 (3.6)	57 (1.5)	72 (1.9)	8

②精検結果

	小学校	中学校
心室期外収縮	2 (2)	9 (3)
上室期外収縮	4 (1)	5
WPW症候群	3	6
心室頻拍		(1)
房室干渉解離		1
心室内伝導障害		1
I度房室ブロック		1
Ⅱ度房室ブロック		Wenckebach 7
ST上昇	1	
左脚前枝ブロック	1	
右脚ブロック	2 * 2	2 * 7
QT延長	3	19
早期再分極症候群		1
左心室緻密化障害		2
川崎病	(30)	(24)
先天性心疾患	術前	1 (5)
	術後	(4)
異常なし	8	40
未精検	3	5

* : 所見あるも管理不要 () : 既管理

Ⅶ－ 3. 幼児健診

平成29年度の受診率は1歳6ヶ月児健診が98.6 %、3歳児健診が 98.0 %といずれも高かった。

① 1歳6ヶ月児健診結果

年度	H25	H26	H27	H28	H29
対 象 者	1,856	1,813	1,834	1,700	1,727
受 診 者	1,792	1,790	1,803	1,681	1,703
受 診 率	96.6%	98.7%	98.3%	98.9%	98.6%
異常なし	1,612	1,570	1,590	1,493	1,501
所見あり	180	220	213	188	202

② 3歳児健診結果

年度	H25	H26	H27	H28	H29
対 象 者	1,850	1,960	1,827	1,815	1,819
受 診 者	1,783	1,872	1,782	1,779	1,782
受 診 率	96.4%	95.5%	97.5%	98.0%	98.0%
異常なし	1,487	1,497	1,438	1,363	1,351
所見あり	296	375	344	416	431

VIII 精度管理实施状况

VIII. 精度管理実施状況

1. 内部精度管理

各検査データの正確性・精密性の維持向上を目的として、日々、検査前の機器や試薬の管理及び検査結果のチェックや評価を行い、技術・精度の向上に努めている。

2. 外部精度管理

次に定める事業に参加している。

(1) 全国労働衛生団体連合会主催の精度管理事業（年1回）

- 項目 ①臨床検査分野；生化学、尿半定量、血液検査
②労働衛生検査分野；有機、鉛検査
③胸部単純X線写真

(2) 日本総合健診医学会主催の精度管理事業（年4回）

- 項目 ①画像／生理検査；胸部単純X線写真、心電図
②検体検査；生化学、血液、尿一般検査、便潜血検査

(3) 日本臨床衛生検査技師会主催の精度管理事業（年1回）

- 項目 ①生理検査、細胞検査、尿一般検査

(4) 日臨技青森県支部主催の精度管理事業（年1回）

- 項目 ①生理検査、細胞検査、尿一般検査

また、委託先である八戸市医師会臨床検査センターでは次の精度管理事業に参加している。

- ・ 日本医師会、青森県医師会主催の精度管理事業
- ・ 日本臨床衛生検査技師会主催の精度管理事業
- ・ 日臨技青森県支部主催の精度管理事業
- ・ 国際試薬「QAPコントロール」の実施
- ・ 医師会、技師会主催の標準化委員会精度管理

事業年報第34集 編集委員会

顧問	岡品	本川	道博	孝樹
委員	西小久三川磯田福田坂高小板	笠林原保浦口谷中島中田橋原垣	真明光耕雄奈しづ郁那恵公峰和	貴雄子佑二平子拓か子美子子子

発行 公益財団法人八戸市総合健診センター
《令和2年3月19日》
〒031-0804 八戸市青葉二丁目17-4
TEL (0178) 45-9131

印刷 (株)オダプリント
八戸市北インター工業団地三丁目2-100
TEL (0178) 21-2711

